

レジメン名	PER+トラスツマブ [®] +DOC初回				
対象がん種	乳がん	対象患者	術前化学療法	催吐リスク	軽度
			術後化学療法	1コースの日数	21日
内服抗がん剤の有無	なし			投与予定回数	1回
※有の場合薬剤名				投与回数上限	

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	52.8%
	発熱性好中球減少	13.8%
		0.0%
その他	下痢	66.8%
	悪心	42.3%
	infusion reaction	頻度不明

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	生理食塩液	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●																					休業完了
2	バージェタ 生理食塩液	840 mg 250 ml	点滴静注	1時間			●																					
3	トラスツマブ [®] BS 注射用水 生理食塩液	8 mg/kg 0.38 ml/kg 250 ml	点滴静注	90分			●																					
4	生理食塩液	100 ml	点滴静注	100 ml/h			●																					
5	ボララミン デキササート 生理食塩液	5 mg 6.6 mg 50 ml	点滴静注	300 ml/h			●																					
6	ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75 mg/m ² 250 ml	点滴静注	1時間			●																					
7	生理食塩液	50 ml		100 ml/h			●																					

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	デカドロン錠	8 mg/日	1日2回		●●		●●	●●																			

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①
点滴静注

生理食塩液	50 ml
	100 ml/h

②
点滴静注

バージェタ 生理食塩液	840 mg 250 ml
	1時間

軽度炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

③
点滴静注

トラスツマブ [®] BS 注射用水 生理食塩液	8 mg/kg 0.38 ml/kg 250 ml
	90分

軽度炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

④
点滴静注

生理食塩液	100 ml
	100 ml/h

⑤
点滴静注

ボララミン デキササート 生理食塩液	5 mg 6.6 mg 50 ml
	300 ml/h

⑥
点滴静注

ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75 mg/m ² 250 ml
	1時間

起壊死性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

⑦
点滴静注

生理食塩液	50 ml
	100 ml/h