

レジメン名	タルセバ+ペバシズマブ併用療法				
対象がん種	肺がん	対象患者		催吐リスク	最小度
				1コースの日数	3週ごと
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	
※有の場合薬剤名	エルロチニブ				

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性		
その他	高血圧	降圧薬の投与
	蛋白尿	
	間質性肺炎	ステロイド投与

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	生食	50mL	点滴静注	200mL/h			●																				休薬完了	
2	生食 ペバシズマブ	100mL 15mg/kg	点滴静注	初回90分、2回目 60分、3回目以降 30分			●																					
3	生食	50mL	点滴静注	200mL/h			●																					

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	エルロチニブ	150mg/日	1日1回		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食	50mL
----	------

200 ml/h

②

点滴静注

生食	100mL
ペバシズマブ	15mg/kg

備考欄参照

③

点滴静注

生食	50mL
----	------

200 ml/h

軽度起炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要
初回90分、2回目60分、3回目以降
30分