

レジメン名	キイトルーダ+パクリタキセル			
対象がん種	乳がん	対象患者	切除不能進行・再発	軽度
			ヒヨースの日数	84日
			投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし		投与回数上限	無制限
※有る場合薬剤名				

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性		
好中球減少	22.0%	パクリタキセルに準ずる
貧血	48.0%	
血小板減少	19.0%	
その他		
頭痛	1%以上	鎮痛薬
悪心、下痢、嘔吐	1%以上	整腸剤、制吐薬等
呼吸困難	1%以上	呼吸器内科相談、減量中止を検討

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	備考(投与時刻、モニターなど)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr																																
2	キイトルーダ	200mg	点滴静注	30min			●																													
3	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr			●																													
4	生食 ガスター ポララミン デキササート	50mL 20mg 5mg 6.6mg	点滴静注	300mL/hr			●																													
5	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr			●																													
6	パクリタキセル	90mg/m ²	点滴静注	1hr			●																													
7	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr			●																													

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	備考(投与時刻、モニターなど)	day	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr																	●															
2	キイトルーダ	200mg	点滴静注	30min																		●														
3	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr																		●														
4	生食 ガスター ポララミン デキササート	50mL 20mg 5mg 6.6mg	点滴静注	300mL/hr																			●													
5	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr																			●													
6	パクリタキセル	90mg/m ²	点滴静注	1hr																			●													
7	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr																			●													

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	備考(投与時刻、モニターなど)	day	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84			
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr																																	
2	キイトルーダ	200mg	点滴静注	30min																																	
3	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr																																	
4	生食 ガスター ポララミン デキササート	50mL 20mg 5mg 6.6mg	点滴静注	300mL/hr																																	
5	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr																																	
6	パクリタキセル	90mg/m ²	点滴静注	1hr																																	
7	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr																																	

滴下順 day1,43,64(Pembrolizumab, PTX投与日)

① 点滴静注 100 ml/h

② 点滴静注 30分

③ 点滴静注 100 ml/h

④ 点滴静注 300 ml/h

⑤ 点滴静注 100 ml/h

⑥ 点滴静注 60分

⑦ 点滴静注 100 ml/h

起壊死性
フィルター必要
バッグ、ルートともに遮光不要

滴下順 day8,15,29,36,57,71(PTX投与日)

① 点滴静注 100 ml/h

② 点滴静注 300 ml/h

③ 点滴静注 100 ml/h

④ 点滴静注 60分

⑤ 点滴静注 100 ml/h

起壊死性
フィルター必要
バッグ、ルートともに遮光不要

滴下順 day22(Pembrolizumab投与日)

① 点滴静注 100 ml/h

② 点滴静注 30分

③ 点滴静注 100 ml/h

該当分類なし
フィルター必要
バッグ、ルートともに遮光不要