

レジメン名	アドセトリス療法				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)			
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)	
血液毒性	好中球減少	65.0%	休薬、G-CSF
	リンパ球減少	75.0%	
	血小板減少	15.0%	
その他	末梢神経障害	49.0%	休薬、減量、中止
	感染症	17.0%	血液検査、CT検査など

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	200mL/hr			●																				
6	アドセトリス 生理食塩液 注射用水	1.8mg/kg 100mL(※) 0.36mL/kg	点滴静注	200mL/hr			●																				
7	生理食塩液	50mL	点滴静注	200mL/hr			●																				

※最終濃度が1.2mg/mLを超える場合は生理食塩液は250mLとすること

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①
点滴静注

生理食塩液	50mL
-------	------

200 ml/h

②
点滴静注

アドセトリス	1.8mg/kg
生理食塩液	100mL
注射用水	0.36mL/kg

200 ml/h

③
点滴静注

生理食塩液	50mL
-------	------

200 ml/h

軽度起炎症性
フィルター不可
バッグ、ルートともに遮光不要
最終濃度が0.4~1.2mg/mLになる
ように生食調節。
1.2mg/mLを超える場合は生食
250mLとする。