レジメン名	mCapeIRI+Bmab				
対象がん種	大腸がん	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日間
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名	Capecitabin				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)(grade≧3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h		●																				
2	デキサート パロノセトロン プリンベラン 生食	9.9 mg 0.75 mg 10 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h		●																				
3	ベバシズマブ 生食	7.5 mg/kg 100 mL	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分まで短縮可		●																				
4	イリノテカン 5%ブドウ糖注	200 mg/m^2 250 mL	点滴静注	2時間		●																				
5	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Capecitabin	800mg/m^2/回	内服			●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●							
2	デカドロン錠	8 mg/day	内服				●●	●●																		