

| レジメン名 | IRIS+Bmab(ベバシズマブ) | | | |
|-----------|-------------------|------|---------|------|
| 対象がん種 | 大腸がん | 対象患者 | 催吐リスク | 中等度 |
| | | | 1コースの日数 | 21日間 |
| | | | 投与予定回数 | PDまで |
| 内服抗がん剤の有無 | あり | | 投与回数上限 | なし |
| ※有の場合薬剤名 | S-1 | | | |

| 副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など) | | |
|------------------------|-----------------|--------------|
| 項目 | 頻度(%) (grade≥3) | 対処法(減量・中止など) |
| 血液毒性 | 発熱性好中球減少症 | 4.8% |
| | 好中球減少 | 36.2% |
| | 貧血 | 10.0% |
| その他 | 下痢 | 20.5% |
| | 食欲不振 | 11.0% |
| | 口内炎 | 2.9% |

レジメン内容(支持療法を含む)

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 投与時刻(必要時) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|------|----------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 1 | 生食 | 50 mL | 点滴静注 | 100 mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 2 | デキササート アロキシ プリンペラン 生食 | 9.9 mg 0.75 mg 10 mg 100 mL | 点滴静注 | 200 mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ベバシズマブ 生食 | 7.5 mg/kg 100 mL | 点滴静注 | 初回90分 2回目60分 3回目以降30分まで短縮可 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | イリノテカン 5%ブドウ糖注 | 150 mg/m ² 250 mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|----|--------|--------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 | S-1 | 80-120mg/day | 内服 | | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | | | | | | | | |
| 2 | デカドロン錠 | 8 mg/day | 内服 | | | ●● | ●● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①
点滴静注

| | |
|----|-------|
| 生食 | 50 mL |
|----|-------|

100 ml/h

②
点滴静注

| | |
|--------|---------|
| デキササート | 9.9 mg |
| アロキシ | 0.75 mg |
| プリンペラン | 10 mg |
| 生食 | 100 mL |

200 ml/h

③
点滴静注

| | |
|--------------|---------------------|
| ベバシズマブ 生食 | 7.5 mg/kg 100 mL |
|--------------|---------------------|

備考欄参照

④
点滴静注

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| イリノテカン 5%ブドウ糖注 | 150 mg/m ² 250 mL |
|-------------------|---------------------------------|

2時間

軽度起炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要
初回90分、2回目60分、3回目以降
30分まで短縮可
終了後生食フラッシュ

炎症性
フィルター不要
バッグは遮光、ルートは遮光不要