| レジメン名 | FP+Pembrolizumab(消化器外科) (1-6コース目) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象がん種 | 食道がん | 対象患者 | 切除不能進行・再発 | 催吐リスク | 高度 |
| | | | | 1コースの日数 | 21日 |
| | | | | 投与予定回数 | 未定 |
| 内服抗がん剤の有無 | なし | | | 投与回数上限 | ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝは最大6回 |
| ※有の場合薬剤名 | | | | | |

| 副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など） | | | |
|---|---|---|---|
| 項目 | | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など) |
| 血液毒性 | 貧血 | 38.6% | 主にFPの減量・中止・延期、輸血 |
| | 好中球数減少 | 36.5% | 主にFPの減量・中止・延期、G-CSF |
| | 下痢 | 26.2% | 主にFPの減量・中止・延期、irAEも |
| その他 | 疲労 | 36.5% | 主にFPの減量・中止・延期、irAEも |
| | 甲状腺機能低下症 | 10.8% | コルチゾールに注意し、チラーヂン内服 |
| | 肺臓炎 | 5.7% | 中止・延期、ステロイド治療、 |

レジメン内容（支持療法を含む）

| | | | | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 備考（投与時刻、モニターなど） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 1 | ソリューゲンF | 500 mL | 点滴静注 | 200mL/hr | 主管A | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 生食 | 100 mL | 点滴静注 | 30分間 | 側A-1 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | キイトルーダ<br>生食 | 200 mg<br>50 mL | 点滴静注 | 30分間 | 側A-1 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生食 | 100 mL | 点滴静注 | 30分間 | 側A-1 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | デキサート<br>プロイメンド<br>生食 | 9.9 mg<br>150 mg<br>100 mL | 点滴静注 | 30分間 | 側A-1 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | パロノセトロン<br>生食 | 0.75 mg<br>100 mL | 点滴静注 | 30分間 | 側A-1 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ソリューゲンF | 500 mL | 点滴静注 | 100ml/hr | 主管A | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 硫酸Mg補正液<br>生食 | 20 mL<br>100 mL | 点滴静注 | 30分間 | 側A-1 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | シスプラチン<br>生食 | 80 mg/m^2<br>500 mL | 点滴静注 | 2時間 | 側A-1 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | デキサート<br>生食 | 6.6 mg<br>100 mL | 点滴静注 | 30分間 | 側A-1 | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | フルオロウラシル<br>5%ブドウ糖 | 800 mg/m^2<br>500 mL | 持続静注 | 24時間 | 側A-1 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ソリューゲンF | 500 mL | 点滴静注 | 100mL/hr | 主管A | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ソリューゲンF | 500 mL | 点滴静注 | 100mL/hr | 主管A | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ソリューゲンF | 500 mL | 点滴静注 | 100mL/hr | 主管A | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ソリューゲンF | 500 mL | 点滴静注 | 100mL/hr | 主管A | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ソリューゲンF | 500 mL | 点滴静注 | 80mL/hr | 主管A | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ソリューゲンF | 500 mL | 点滴静注 | 80mL/hr | 主管A | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ソリューゲンF | 500 mL | 点滴静注 | 80mL/hr | 主管A | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ソリューゲンF | 500 mL | 点滴静注 | 80mL/hr | 主管A | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |