レジメン名		EPd频	<b>療法(3コー</b> 2	ス目)	
対象がん種	多発性骨髄腫	対象患者	催	吐リスク	軽度
		1	1⊐	一スの日数	28日
		1	投-	与予定回数	1コース
内服抗がん剤の有無	あり	1	投-	与回数上限	10
※有の場合薬剤名	ポマリドミド	1			

副作用情報(場	頁度が高い、特徴的な副作	用など)	
	項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	18.3%	Lenalidomide:休薬、減量
	貧血	10.0%	
	血小板減少	10.0%	Lenalidomide:休薬、減量
その他	infusion reaction	28.3%	添付文書参照
	白内障	5.0%	
	感染症	65.0%	休薬及び抗生剤の投与等

レジメン内容(支持療法を含む)

					day	1	1 2	3	4	1 5	5	6	7 -	3 9	) 10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度·時間	投与時刻(必要時)	,																											休薬完了
1	1 生食	50lm	点滴静注	100ml/h		•																											$\neg$
ı	デキサート 生食	6.6mg 50ml	点滴静注	500ml/h	エンプリシティ投 与の45分前まで に投与完了	•																											
3	ポララミン 3 ガスター 生食	5mg 20mg 50ml	点滴静注	100ml/h	エンブリシティ投 与の45~90分前 までに投与完了	•																											
- 4	生食	50ml	点滴静注	200ml/h		•																											
5	エムプリシティ 5 注射用水 生食	20mg/kg 0.8mg/kg 250ml(体重50kg 未満:150ml,体 重50~90kg: 250ml,体重 90kg超:350ml)	点滴静注	投与開始0~30 分:180ml/h、投 与開始30分以 降:240ml/h		•																											
6	5 生食	50ml	点滴静注	200ml/h		•																											

内服抗がん剤・支持療法薬																																
Rp 薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 ポマリドミド	4mg				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
2 デキサメタゾン	28mg(75歳を超:	エンプリシティ投与	の3~24時間まで	に投与完了	•																										-	
3 デキサメタゾン	40mg(75歳を超:	エンプリシティ投与	の3~24時間まで	に投与完了								•							•							•				-	-	
4 カロナール	300~1000mg	エンプリシティ投与	の45~90分前ま	でに投与完了	•																									-	-	
5 高尿酸血症治療薬					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6 感染症予防薬					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7 静脈血栓塞栓症予防薬					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•