

レジメン名	キイトルーダ(3週毎)+レンビマ併用療法				
対象がん種	子宮体がん	対象患者	難治	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	あり		投与回数上限		35サイクル
※有の場合薬剤名	レンビマ				

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	貧血	14.0% Hb $\geq$ 9.0g/dlとなるまで休薬
		-
		-
その他	高血圧	61.3% 収縮期血圧150mmHg以下及び拡張期
	甲状腺機能低下症	54.7% Grade1以下になるまで休薬
	下痢	42.1% Grade1以下になるまで休薬

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	生食	50mL	点滴静注	100ml/hr			●																				休薬完了	
2	キイトルーダ 生食	200mg 50mL	点滴静注	30min			●																					
3	生食	50mL	点滴静注	100ml/hr			●																					

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	レンビマカプセル4mg・10mg	1回20mg	1日1回		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食 50mL

100 ml/h

②

点滴静注

キイトルーダ 200mg  
生食 50mL

30分

③

点滴静注

生食 50mL

100 ml/h

該当分類なし

フィルター必要

バッグ、ルートともに遮光不要