レジメン名	エンハーツ(胃癌)				
対象がん種	胃がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	なし
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	50.4%(grade 3以上)	減量、中止、延期
	白血球減少	20.8%(grade 3以上)	減量、中止、延期
	貧血	24.8%(grade 3以上)	減量、中止、延期
その他	食欲減退	14.4%(grade 3以上)	減量、中止、延期
	間質性肺炎	8.7%	中止

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●																				
2	デキサート 生食	6.6mg 50ml	点滴静注	100ml/h		●																				
3	ブドウ糖	50ml	点滴静注	200ml/h		●																				
4	エンハーツ点滴静注用100mg 注射用水 ブドウ糖5%	6.4mg/kg 0.32ml/kg 100ml	点滴静注	初回90分 2回目以降30分ま で短縮可		●																				
5	ブドウ糖	50ml	点滴静注	200ml/h		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	グラニセトロン	2mg	抗がん剤投与前			●																				