

レジメン名	TCトラスツマブ <sup>®</sup> （初回導入）				
対象がん種	乳がん	対象患者		催吐リスク	高度
				1コースの日数	21日
内服抗がん剤の有無 ※有の場合薬剤名				投与予定回数	なし
				投与回数上限	なし

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性		0.0%
		0.0%
		0.0%
その他		0.0%
		0.0%
		0.0%

レジメン内容（支持療法を含む）

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●																				休薬完了
2	トラスツマブBS 注射液 生食	4 mg/kg 0.19ml/kg 250 ml	点滴静注	90分			●																				
3	トラスツマブBS 注射液 生食	2 mg/kg 0.095ml/kg 250 ml	点滴静注	1時間										●							●						
3	デキササート 生食	6.6 mg 100 ml	点滴静注	200 ml/h			●																				
4	ドセタキセル 5% ブドウ糖液	75 mg/m <sup>2</sup> 250 ml	点滴静注	1時間			●																				
5	カルボプラチン 5% ブドウ糖液	AUC:6 250 ml	点滴静注	1時間			●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	グラニセトロン	2 mg	化学療法前		●																					
2	デカドロン錠	4 mg	朝・夕食後			●●	●●																			

day 1 滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

生食	50 ml
100 ml/h	

②

トラスツマブBS 注射液 生食	4 mg/kg 0.19ml/kg 250 ml
90分	

軽度炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

③

デキササート 生食	6.6 mg 100 ml
200 ml/h	

④

ドセタキセル 5% ブドウ糖液	75 mg/m <sup>2</sup> 250 ml
1時間	

起壊死性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

⑤

カルボプラチン 5% ブドウ糖液	AUC:6 250 ml
1時間	

炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

day 8, 15

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

①

生食	50 ml
100 ml/h	

②

トラスツマブBS 注射液 生食	2 mg/kg 0.095ml/kg 250 ml
1時間	

軽度炎症性  
フィルター不要