レジメン名	イリノテカン/ラムシルマブ併用療法				
対象がん種	胃がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	28日
				投与予定回数	未定
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	白血球減少	77.0%	G-CSF製剤
	好中球数減少	83.0%	減量・中止・延期
	FN	11.0%	減量・中止・延期
その他	高血圧	91.0%	減量・中止・延期
	貧血	83.0%	減量・中止・延期
	下痢	49.0%	減量・中止・延期

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生理食塩液	50ml	点滴静注	100ml/h		●														●													
2	生理食塩液 アロキシ デキサート ボララミン注	50ml 0.75mg 9.9mg 5mg	点滴静注	300ml/h		●														●													
3	生理食塩液 サイラムザ	250ml 8mg/kg	点滴静注	1時間 (初回忍容性が良好の場合、2回目以降30分まで短縮可)		●														●													
4	生理食塩液	100mL	点滴静注	1-2コース目は100ml/h 、3コース目以降400ml/hでも可		●														●													
5	生理食塩液 イリノテカン	500ml 150mg/㎡	点滴静注	90分		●														●													
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●														●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	デカドロン錠	4mg/回	1日2回				●●	●●													●●	●●											