

レジメン名	ペムプロリズマブ+CBDCA+PTX				
対象がん種	肺がん	対象患者	切除不能進行・再発	中等度	
			除不能進行・再発	1コースの日数	21
			投与予定回数	4	
内服抗がん剤の有無	なし		投与回数上限	6	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	貧血	44.2%
	好中球減少	34.9%
	血小板減少	29.1%
その他	神経系障害	51.1%
	悪心	80.6%
	免疫関連有害事象	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●																				休薬完了	
2	キイトルーダ 生食	200mg 50mL	点滴静注	30分			●																					
3	生食	50mL	点滴静注	200mL/h			●																					
4	フロイメンド 生食	150mg 100mL	点滴静注	200mL/h			●																					
5	デキサート アロキシ ガスター注 ボラミン注 生食	9.9mg 0.75mg 20mg 5mg 100mL	点滴静注	200mL/h			●																					
6	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●																					
7	パクリタキセル 5%ブドウ糖注	200mg/m ² 500mL	点滴静注	3時間			●																					
8	カルボプラチン 5%ブドウ糖注	AUC=6 250mL	点滴静注	1時間			●																					
9	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●																					

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	デカロン錠	4mg/回	朝食後			●	●																			

滴下順
注意
投与方法

① 点滴静注 生食 50mL 100 ml/h	② 点滴静注 キイトルーダ 生食 200mg 50mL 30分 フィルター必要 バッグ、ルートともに遮光不	③ 点滴静注 生食 50mL 200 ml/h	④ 点滴静注 フロイメンド 生食 150mg 100mL 200 ml/h	⑤ 点滴静注 デキサート アロキシ ガスター注 ボラミン注 生食 9.9mg 0.75mg 20mg 5mg 100mL 200 ml/h	⑥ 点滴静注 生食 50mL 100 ml/h	⑦ 点滴静注 パクリタキセル 5%ブドウ糖注 200mg/m ² 500mL 3時間 フィルター必要 バッグ、ルートともに遮光不要	⑧ 点滴静注 カルボプラチン 5%ブドウ糖注 AUC=6 250mL 1時間 フィルター不要 バッグ、ルートともに遮光不	⑨ 点滴静注 生食 50mL 100 ml/h
-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------

薬剤・用量
投与速度/時間
投与時刻(必要時)
漏出リスク
フィルター
遮光
備考