レジメン名	CHOP(3週毎)					
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	進行期:6～8コース
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	8コース
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少		
	貧血		
その他	悪心・嘔吐		
	末梢神経障害		
	脱毛		

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●																				
2	オンコビン 生食	1.4mg/㎡ 50ml	点滴静注	500ml/h		●																				
3	ドキソルビシン 生食	50mg/㎡ 100ml	点滴静注	200ml/h		●																				
4	エンドキサン 生食	750mg/㎡ 250ml	点滴静注	250ml/h		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	カイトリル	2mg	化学療法前			●																				
2	プレドニゾロン	50mg/回	1日2回			●●	●●	●●	●●	●●																