レジメン名	イリノテカン+Cmab2回目以降				
対象がん種	大腸がん	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	14日
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	15.4%	
	リンパ球減少	30.8%	
	低マグネシウム血	33.3%	
その他	下痢	51.3%	
	発疹	61.5%	
	ざ瘡	87.2%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●							●						
2	デキサート プリンペラン ポララミン 生食	9.9mg 10mg 5mg 100ml	点滴静注	200ml/h		●													
3	ポララミン 生食	5mg 100ml	点滴静注	200ml/h									●						
4	アービタックス 生食	250mg/㎡ 250ml	点滴静注	1時間		●							●						
5	生食	100ml	点滴静注	100ml/h		●							●						
6	イリノテカン 生食	120mg/㎡ 250ml	点滴静注	125ml/h		●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	なし																		