レジメン名	タルセバ+アバスチン併用療法				
対象がん種	肺がん	対象患者		催吐リスク	最小度
				1コースの日数	3週ごと
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他	高血圧		降圧薬の投与
	蛋白尿		
	間質性肺炎		ステロイド投与

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●																				
2	生食 アバスチン	100mL 15mg/kg	点滴静注	初回90分、2回目60分、3回目以降30分		●																				
3	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	タルセバ	150mg/日	1日1回			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●