レジメン名	PEM単剤療法					
対象がん種	悪性胸膜中皮腫	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	3週間毎
				投与予定回数	4コース
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	5.3%	G-CSF投与
	貧血	4.2%	輸血
	血小板減少	1.9%	輸血
その他	悪心	30.2%	制吐剤使用
	疲労	24.5%	
	嘔吐	16.2%	制吐剤使用

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●																				
2	生食 デキサート	100mL 6.6mg	点滴静注	200mL/h		●																				
3	アリムタ 生食	500mg/㎡ 100mL/h	点滴静注	500mL/h		●																				
4	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																									