

令和4年4月7日

第226回薬事委員会審議結果報告

- * 新規採用医薬品、仮採用医薬品の処方開始は4月13日（水）となります。
- * 後発医薬品への切替えは4月13日（水）以降、先発医薬品の院内在庫が終了次第、随時行います。なお、院外処方については引き続き、先発医薬品も処方可能です。
- * 仮採用医薬品については、全診療科においてオーダーリング可能とし、採用期間は原則として1年間です。

-
- | | |
|--|-----------------------------------|
| * ゾシン静注用 4.5g
タゾバクタム・ピペラシリン

β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 | 大正富山医薬品
院内在庫がなくなり次第、削除(オーダー停止) |
|--|-----------------------------------|
-
- | | |
|--|---|
| * ソセゴン錠 25mg
塩酸ペンタゾシン

オピオイド | 丸石製薬
院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更(院内オーダー停止) |
|--|---|
-
- | | |
|---|--------------------------------|
| * ニコリンH注射液1g
シチコリン

意識障害改善剤 | 武田テバ
院内在庫がなくなり次第、削除(オーダー停止) |
|---|--------------------------------|
-
- | | |
|---|--------------------------------|
| * ノイトロジン注250μg
レノグラスチム

遺伝子組換えヒトG-CSF製剤 | 中外製薬
院内在庫がなくなり次第、削除(オーダー停止) |
|---|--------------------------------|
-
- | | |
|---|---|
| * ベプシドカプセル 25mg
エトポシド

抗悪性腫瘍剤 | クリニジェン
院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更(院内オーダー停止) |
|---|---|
-

* イブランス錠25mg	ファイザー
パルボシクリブ	採用条件: 院外採用(院外処方のみオーダーリング可)
抗悪性腫瘍剤(CDK 4/6阻害剤)	薬価 5,679.7円/錠
* イブランス錠125mg	ファイザー
パルボシクリブ	採用条件: 院外採用(院外処方のみオーダーリング可)
抗悪性腫瘍剤(CDK 4/6阻害剤)	薬価 22,978.1円/錠
* エナジア吸入用カプセル中用量	ノバルティスファーマ
インダカテロール酢酸塩/グリコピロニウム臭化物/ モメタゾンフランカルボン酸エステル	採用条件: 院外採用(院外処方のみオーダーリング可) 院内在庫なくなり次第、院外のみ採用へ変更(院内オーダー停止)
3成分配合喘息治療剤	薬価 2,032.1円/枚
* エナジア吸入用カプセル高用量	ノバルティスファーマ
インダカテロール酢酸塩/グリコピロニウム臭化物/ モメタゾンフランカルボン酸エステル	採用条件: 院外採用(院外処方のみオーダーリング可) 院内在庫なくなり次第、院外のみ採用へ変更(院内オーダー停止)
3成分配合喘息治療剤	薬価 2,320.5円/枚
* キャブピリン配合錠	武田薬品工業
アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩	採用条件: 院外採用(院外処方のみオーダーリング可)
アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩配合剤	薬価 126.7円/錠
* テリルジー100エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
フルチカゾン・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	採用条件: 院外採用(院外処方のみオーダーリング可) 院内在庫なくなり次第、院外のみ採用へ変更(院内オーダー停止)
3成分配合COPD治療剤	薬価 8,805.1円/キット
* テリルジー200エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
フルチカゾン・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	採用条件: アドエア500ディスカス60吸入用、メプチン吸入液0.01%は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更(院内オーダー停止)
3成分配合喘息治療剤	薬価 10,043.3円/キット
* ビベスピエアロスフィア28吸入	アストラゼネカ
グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用条件: 院外採用(院外処方のみオーダーリング可) 院内在庫なくなり次第、院外のみ採用へ変更(院内オーダー停止)
COPD治療配合剤	薬価 1,741.7円/キット
* ビレーズトリエアロスフィア56吸入	アストラゼネカ
ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用条件: アドエア500ディスカス60吸入用、メプチン吸入液0.01%は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更(院内オーダー停止)
COPD治療配合剤	薬価 4,127.6円/キット
* ベージニオ錠50mg	日本イーライリリー
アベマシクリブ	採用条件: 院外採用(院外処方のみオーダーリング可)
抗悪性腫瘍剤 CDK4及び6阻害剤	薬価 3,319.0円/錠

<p>* ベージニオ錠100mg アベマシクリブ</p>	<p>日本イーライリリー 採用条件： 院外採用(院外処方のみオーダーリング可)</p>
<p>抗悪性腫瘍剤 CDK4及び6阻害剤</p>	<p>薬価 6,059.4円/錠</p>
<p>* ベージニオ錠150mg アベマシクリブ</p>	<p>日本イーライリリー 採用条件： 院外採用(院外処方のみオーダーリング可)</p>
<p>抗悪性腫瘍剤 CDK4及び6阻害剤</p>	<p>薬価 8,616.8円/錠</p>
<p>* ラツーダ錠20mg ルラシドン塩酸塩</p>	<p>大日本住友製薬 採用条件： ドグマチール錠100mgは院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更(院内オーダー停止)</p>
<p>抗精神病薬／双極性障害のうつ症状治療薬</p>	<p>薬価 178.7円/錠</p>

仮採用医薬品 14件

第226回薬事委員会 令和4年3月16日

* アクテムラ点滴静注用 200mg トシリズマブ(遺伝子組換え) ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体	中外製薬	薬価 36,572円/瓶
* アクテムラ点滴静注用 80mg トシリズマブ(遺伝子組換え) ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体	中外製薬	薬価 14,919円/瓶
* アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター トシリズマブ(遺伝子組換え) ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体	中外製薬	薬価 32,608円/キット
* アラグリオ顆粒剤分包1.5g アミノレブリン酸塩酸塩顆粒剤 光線力学診断用剤	日本化薬	薬価 76,190.5円/包
* アラベル内用剤 1.5g アミノレブリン酸塩酸塩 光線力学診断用剤	ノーベルファーマ	薬価 92,051.5円/瓶
* オレンシア点滴静注用 250mg アバタセプト(遺伝子組換え) T細胞選択的共刺激調節剤	ブリistol・マイヤーズ	薬価 55,200円/瓶
* オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL アバタセプト(遺伝子組換え) T細胞選択的共刺激調節剤	ブリistol・マイヤーズ	薬価 28,547円/キット
* オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 オンダンセトロン塩酸塩水和物 5-HT3受容体拮抗型制吐剤	丸石	薬価 3,524円/筒
* ダラキューロ配合皮下注 ダラツムマブ(遺伝子組換え) ヒト型抗CD38モノクローナル抗体/ヒアルロン酸分解酵素配 合剤	ヤンセン	薬価 434,209円/瓶
* ツイミーグ錠500mg イメグリミン 糖尿病用剤	大日本住友	薬価 34.4円/錠

* プレバイミス錠240mg	MSD
レテルモビル	
抗サイトメガロウイルス化学療法剤	薬価 14,645.5円/錠
* プレバイミス点滴静注240mg	MSD
レテルモビル	
抗サイトメガロウイルス化学療法剤	薬価 18,228円/瓶
* テンビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL 「センジュ」	千寿
ラニビズマブ(遺伝子組換え)	
眼科用VEGF阻害剤	薬価 85,535円/筒
* レナデックス錠 4mg	ブリistol・マイヤーズ
デキサメタゾン	採用条件: 血液内科・脳神経内科限定でオーダーリング可
副腎皮質ホルモン剤	薬価 172.1円/錠

仮採用終了医薬品 5件

第226回薬事委員会 令和4年3月16日

* アテキュラ吸入用カプセル低用量 インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル 喘息治療配合剤	ノバルティスファーマ 院内在庫がなくなり次第、削除(オーダ停止)
	薬価 1,104.6円/枚
* アテキュラ吸入用カプセル中用量 インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル 喘息治療配合剤	ノバルティスファーマ 院内在庫がなくなり次第、削除(オーダ停止)
	薬価 1,211.7円/枚
* アテキュラ吸入用カプセル高用量 インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル 喘息治療配合剤	ノバルティスファーマ 院内在庫がなくなり次第、削除(オーダ停止)
	薬価 1,345.4円/枚
* エクフィナ錠50mg サフィナミドメシル酸塩 パーキンソン病治療剤	エーザイ
	薬価 953.2円/錠
* ニュベクオ錠300mg ダロルタミド 前立腺癌治療剤	バイエル薬品
	薬価 2,311.0円/錠

* エスゾピクロン錠1mg 「サワイ」	沢井
エスゾピクロン	ルネスタ錠1mgの院内在庫がなくなり次第オーダーリング開始
不眠症治療薬	ルネスタ錠1mgは院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更(院内オーダー停止)
	薬価 17.00円/錠
* シクロスポリンカプセル10mg 「サント」	サント
シクロスポリン	ネオーラルカプセル10mgの院内在庫がなくなり次第オーダーリング開始
免疫抑制剤(カルシニューリンインヒビター)	ネオーラルカプセル10mgは院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更(院内オーダー停止)
	薬価 31.30円/cap
* シクロスポリンカプセル25mg 「サント」	サント
シクロスポリン	ネオーラルカプセル25mgの院内在庫がなくなり次第オーダーリング開始
免疫抑制剤(カルシニューリンインヒビター)	ネオーラルカプセル25mgは院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更(院内オーダー停止)
	薬価 63.50円/cap

院外採用医薬品の採用規格追加のお知らせ

令和4年3月16日

薬効	既採用医薬品	追加採用規格	申請科
経皮吸収型・ β 1遮断剤	ビソノテープ2mg [院内・院外] ビソノテープ4mg [院内・院外]	8mg	循環器内科

製造販売中止等に伴う採用中止のお知らせ

令和4年3月16日

薬効	採用中止製品	当院採用の同効類薬	備考
骨粗鬆症治療剤	オステン錠200mg 【院外採用】 (武田テバ)	-	オステン錠200mgの製造販売中止に伴い供給停止 【製造販売中止時期:2021年8月】 【経過措置満了時期(予定):2022年3月】
骨粗鬆症治療薬	フォサマック錠5 【院外採用】 (オルガノン)	アクトネル錠2.5mg 【院外採用】 (EAファーマ)	フォサマック錠5mgの製造販売中止に伴い供給停止 【製造販売中止時期:2021年5月】 【経過措置満了時期(予定):2022年3月】
非脱分極性麻酔用筋弛緩剤	ベクロニウム静注用10mg「F」 【院内採用】 (富士製薬)	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」 【院内採用】 (丸石製薬)	ベクロニウム静注用10mg「F」の製造販売中止に伴い供給停止 【製造販売中止時期(予定):2022年4月】 【経過措置満了時期(予定):2023年3月】
徐放性ドパミンD2受容体系作動薬	ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」 【院内外採用】 (沢井製薬)	レキップCR錠2mg 【院外採用】 (GSK)	ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」の出荷調整に伴い供給停止 院外のみ採用へ変更 【出荷調整時期:2021年6月】 【供給再開時期:未定】

出荷再開に伴う採用製品変更のお知らせ

令和4年3月16日

薬効	採用中止製品	採用再開製品	変更理由
歯科用局所麻酔剤	スキヤンドネストカートリッジ3% 【院内採用】 (日本歯科)	歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ 【院内採用】 (デンツプライ)	「歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ」の販売一時中止に伴い、「スキヤンドネストカートリッジ3%」へ採用変更としていた。 販売再開に伴い、再度採用製品変更。

緊急常備薬の採用のお知らせ

令和4年3月16日

※緊急時に使用するために必要最小量を常備するが、管理場所は薬剤部のみに限定する。
 ※原則として手書き処方を廃止し、全てオーダーリングとする。

対象医薬品名	効能効果	用法用量														
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	アセトアミノフェン過量摂取時の解毒	通常、本剤又は本剤を希釈した液を、初回にアセチルシステインとして140mg/kg、次いでその4時間後から70mg/kgを4時間毎に17回、計18回経口投与する。経口投与が困難な場合は、胃管又は十二指腸管により投与する。投与後1時間以内に嘔吐した場合は、再度同量を投与する。														
ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」	エチレングリコール中毒、メタノール中毒	通常、ホメピゾールとして初回は15mg/kg、2回目から5回目は10mg/kg、6回目以降は15mg/kgを、12時間ごとに30分以上かけて点滴静注する。														
メチレンブルー静注50mg「第一三共」	中毒性メヘモグロビン血症	通常、生後3ヵ月を過ぎた乳幼児、小児及び成人には、メチルチオニウム塩化物水和物として1回1～2mg/kgを5分以上かけて静脈内投与する。投与1時間以内に症状が改善しない場合は、必要に応じ、同量を繰り返し投与できるが、累積投与量は最大7mg/kgまでとする。 通常、新生児及び生後3ヵ月以下の乳児には、メチルチオニウム塩化物水和物として1回0.3～0.5mg/kgを5分以上かけて静脈内投与する。投与1時間以内に症状が改善しない場合は、必要に応じ、同量を繰り返し投与できる。														
プリズバインド静注液2.5g	以下の状況におけるダビガトランの抗凝固作用の中和 ・生命を脅かす出血又は止血困難な出血の発現時 ・重大な出血が予想される緊急を要する手術又は処置の施行時	通常、成人にはイダルシズマブ(遺伝子組換え)として1回5g(1バイアル2.5g/50mLを2バイアル)を点滴静注又は急速静注する。ただし、点滴静注の場合は1バイアルにつき5～10分かけて投与すること。														
ケイセントラ静注用500 ケイセントラ静注用1000	ビタミンK拮抗薬投与中の患者における、急性重篤出血時、又は重大な出血が予想される緊急を要する手術・処置の施行時の出血傾向の抑制	通常、血液凝固第IX因子として、下記の投与量を単回静脈内投与する。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">投与前のプロトロンビン時間-国際標準比 (PT-INR)</th> <th colspan="2">投与量</th> </tr> <tr> <th>体重100kg以下の場合</th> <th>体重100kgを超える場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2～<4</td> <td>25IU/kg</td> <td>2500IU</td> </tr> <tr> <td>4～6</td> <td>35IU/kg</td> <td>3500IU</td> </tr> <tr> <td>>6</td> <td>50IU/kg</td> <td>5000IU</td> </tr> </tbody> </table>	投与前のプロトロンビン時間-国際標準比 (PT-INR)	投与量		体重100kg以下の場合	体重100kgを超える場合	2～<4	25IU/kg	2500IU	4～6	35IU/kg	3500IU	>6	50IU/kg	5000IU
投与前のプロトロンビン時間-国際標準比 (PT-INR)	投与量															
	体重100kg以下の場合	体重100kgを超える場合														
2～<4	25IU/kg	2500IU														
4～6	35IU/kg	3500IU														
>6	50IU/kg	5000IU														
サビーン点滴静注用500mg	アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出	通常、成人には、デクスラゾキサソールとして、1日1回、投与1日目及び2日目は1000mg/m ² (体表面積)、3日目は500mg/m ² を1～2時間かけて3日間連続で静脈内投与する。なお、血管外漏出後6時間以内に可能な限り速やかに投与を開始し、投与2日目及び3日目は投与1日目と同時刻に投与を開始する。また、用量は、投与1日目及び2日目は各2000mg、3日目は1000mgを上限とする。 中等度及び高度の腎機能障害のある患者(クレアチニンクリアランス:40mL/min未満)では投与量を通常の半量とする。														
ベクルリー点滴静注用100mg	SARS-CoV-2による感染症	通常、成人及び体重40kg以上の小児にはレムデシビルとして、投与初日に200mgを、投与2日目以降は100mgを1日1回点滴静注する。 通常、体重3.5kg以上40kg未満の小児にはレムデシビルとして、投与初日に5mg/kgを、投与2日目以降は2.5mg/kgを1日1回点滴静注する。 なお、総投与期間は10日までとする。														