レジメン名	EPd療法(1コース目)				
対象がん種	多発性骨髄腫	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	28日
				投与予定回数	1コース
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	1回
※有の場合薬剤名	ポマリドミド				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	18.3%	Lenalidomide：休薬、減量
	貧血	10.0%	
	血小板減少	10.0%	Lenalidomide：休薬、減量
その他	infusion reaction	28.3%	添付文書参照
	白内障	5.0%	
	感染症	65.0%	休薬及び抗生剤の投与等

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生食	50lm	点滴静注	100ml/h		●							●							●							●						
2	デキサート 生食	6.6mg 50ml	点滴静注	500ml/h	エンプリシティ投与の45分前までに投与完了	●							●							●							●						
3	ボララミン ガスター 生食	5mg 20mg 50ml	点滴静注	100ml/h	エンプリシティ投与の45～90分前までに投与完了	●							●							●							●						
4	生食	50ml	点滴静注	200ml/h		●							●							●							●						
5	エムプリシティ 注射用水 生食	10mg/kg 0.4mg/kg 250ml（体重50kg未満：150ml、体重50～90kg：250ml、体重90kg超：350ml）	点滴静注	初回投与 投与開始0～30分：30ml/h、投与開始30～60分：60ml/h、投与開始60分以降：120ml/h 2回目投与 投与開始0～30分：180ml/h、投与始30以降：240ml/h 3及び4回目投与：300ml/h		●							●							●							●						
6	生食	50ml	点滴静注	200ml/h		●							●							●							●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ポマリドミド	4mg				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
2	デキサメタゾン	28mg（75歳を超え	エンプリシティ投与の3~24時間までに投与完了			●							●							●							●						
3	カロナール	300～1000mg	エンプリシティ投与の45~90分前までに投与完了			●							●							●							●						
4	高尿酸血症治療薬					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	感染症予防薬					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	静脈血栓塞栓症予防薬					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●