レジメン名	G-ベンダムスチン(液剤)(2-6コース目)療法				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	5
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	5
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	36.8%	G-CSF、延期、減量
	リンパ球減少		
	血小板減少	15.5%	輸血、延期、減量
その他	悪心・嘔吐	#REF!	#REF!
	皮膚障害	86.0%	制吐剤
	感染症	63.2%	血液検査、CT検査など

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●																										
2	トレアキシン 生理食塩液	90mg/m2 50mL	点滴静注	10分		●	●																										
3	ポララミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	100mL/h ※前回投与で infusion reaction の発現がなかったら不要		●																											
4	ガザイバ 生理食塩液	1000mg 210mL	点滴静注	前回の投与で Garde2以上の infusion reaction が発現しなかった場合】 25mL/hrで開始し、30分ごとに 25mL/hrずつ 最大 100mL/hrまで増量可		●																											
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●																										

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンゼリー or カイトリル	2mg	化学療法前			●	●																										
2	カロナール	900mg	ガザイバ30分前			●																											
3	プレドニゾロン錠（プレドニン注） or デカドロン錠（デキサート注） or ソル・メドロール注	100mg or 20mg or 80mg	ガザイバ投与1時間前までに投与完了 ※前回投与で infusion reaction の発現がなかったら不要			●																											
4	他、適宜ST合剤、アシクロビルなどの抗ウイルス薬、G-CSFなど																																