レジメン名	後発GEM(隔週)				
対象がん種	胆道がん	対象患者		催吐リスク	軽度
	膵がん			1コースの日数	28日
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																										休薬完了
1	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h		•														•											
2	生食 ゲムシタビン	100 ml 1000mg/㎡	点滴静注	200 ml/h		•														•											

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																														

滴下順		
主管	①	②
投与方法	点滴静注	点滴静注
薬剤・用量	生食 50 ml	ゲムシタビン 1000mg/㎡ 生食 100 ml
投与速度/時間	100 ml/h	200 ml/h
投与時刻(必要時)		
漏出時リスク		炎症性
フィルター		フィルター不要
遮光		バッグ、ルートともに遮光不要
備考		