

レジメン名	アテゾリズマブ+CBDCA+PTX+BV			
対象がん種	肺がん	対象患者	切除不能進行・再発	中等度
			催吐リスク	
内服抗がん剤の有無 ※有の場合薬剤名	なし		1コースの日数	21
			投与予定回数	4
			投与回数上限	6

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	血小板減少	13.7%
	好中球減少	12.2%
	貧血	24.7%
その他	末梢性ニューロパシー	22.4%
	高血圧	19.8%
	免疫関連有害事象	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●																				休薬完了
2	テセントリク 生食	1200mg 250mL	点滴静注	初回270mL/h 2回目以降 500mL/h			●																				
3	生食	50mL	点滴静注	200mL/h			●																				
4	アバステン 生食	15mg/kg 100mL	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分			●																				
5	プロイメンド 生食	150mg 100mL	点滴静注	200mL/h			●																				
6	デキサート アロキシ ガスター注 ボラミン注 生食	9.9mg 0.75mg 20mg 5mg 100mL	点滴静注	200mL/h			●																				
7	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●																				
8	バクリタキセル 5%ブドウ糖注	200mg/m ² 500mL	点滴静注	180mL/h			●																				
9	カルボプラチン 5%ブドウ糖注	AUC=6 250mL	点滴静注	250mL/h			●																				
10	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	デカドロン錠	4mg/回	朝食後			●	●																			

滴下順

主観	投与方法	薬剤・用量	投与速度/時間	投与時刻(必要時)	漏出時リスク	フィルター	遮光	備考
①	点滴静注	生食 50mL	100 ml/h					
②	点滴静注	テセントリク 1200mg 生食 250mL	備考欄参照					フィルター必要 バッグ、ルートともに遮光不 初回270mL/h, 2回目以降 500mL/h
③	点滴静注	生食 50mL	200 ml/h					
④	点滴静注	アバステン 15mg/kg 生食 100mL	備考欄参照					フィルター不要 バッグ、ルートともに遮光不 初回90分, 2回目60分, 3回目以降30分
⑤	点滴静注	プロイメンド 150mg 生食 100mL	200 ml/h					
⑥	点滴静注	デキサート 9.9mg アロキシ 0.75mg ガスター注 20mg ボラミン注 5mg 生食 100mL	200 ml/h					
⑦	点滴静注	生食 50mL	100 ml/h					
⑧	点滴静注	バクリタキセル 200mg/m ² 5%ブドウ糖注 500mL	備考欄参照					フィルター必要 バッグ、ルートともに遮光不 180mL/h(3時間)
⑨	点滴静注	カルボプラチン AUC=6 5%ブドウ糖注 250mL	250 ml/h					フィルター不要 バッグ、ルートともに遮光不
⑩	点滴静注	生食 50mL	100 ml/h					