

レジメン名	G単剤（ガザイバ）			
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	催吐リスク	最小度
			1コースの日数	56
内服抗がん剤の有無	なし		投与予定回数	PDまで
※有の場合薬剤名			投与回数上限	2年間

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性		
その他	infusion reaction 感染症	中断、投与速度の変更、薬剤使用、

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr			●																											
2	ボララミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	100mL/hr			●																											
3	ガザイバ 生理食塩液	1000mg 210mL	点滴静注	25mL/hrで開始し、 30分ごとに 25mL/hrずつ 最大 100mL/hrまで 増量可			●																											
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr			●																											

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr																															休業完了
2	ボララミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	100mL/hr																															
3	ガザイバ 生理食塩液	1000mg 210mL	点滴静注	25mL/hrで開始し、 30分ごとに 25mL/hrずつ 最大 100mL/hrまで 増量可																															
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr																															

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	カロナール	900mg	ガザイバ30分前		●																													

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
1	カロナール	900mg	ガザイバ30分前																															

滴下順

主管

投与方法	①	②	③	④
薬剤・用量	点滴静注 生理食塩液 50mL	点滴静注 ボララミン 5mg 生理食塩液 50mL	点滴静注 ガザイバ 1000mg 生理食塩液 210mL	点滴静注 生理食塩液 50mL
投与速度・時間	100 ml/h	100 ml/h	備考欄参照	100 ml/h

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

軽度起炎症性
フィルター必要
バッグ、ルートともに遮光不要
25mL/hrで開始し、
30分ごとに25mL/hrずつ
最大 100mL/hrまで増量可