

レジメン名	カバジタキセル療法				
対象がん種	前立腺がん	対象患者	切除不能進行	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	21
内服抗がん剤の有無	あり		投与予定回数	規定なし	
※有の場合薬剤名	プレドニゾン		投与回数上限	規定なし	

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	貧血	8.4%
	白血球減少	5.1%
	発熱性好中球減少	7.5%
その他	味覚異常	10.2%
	下痢	36.4%
	疲労	29.6%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50mL	点滴静注	300mL/h			●																				休薬完了
2	デキサート ボラミン注 ガスター注 生食	6.6mg 5mg 20mg 50mL	点滴静注	100mL/h			●																				
3	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●																				
4	ジェブタナ 生食	25mg/m ² 250mL (濃度<0.1mg/mL のとき生食 100mL, >0.26mg/mLのとき 生食500mL)	点滴静注	1時間			●																				
5	生食	50mL	点滴静注	300mL/h			●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	プレドニゾン錠	5mg/回	1日2回		●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①
点滴静注

生食	50mL
----	------

②
点滴静注

デキサート	6.6mg
ボラミン注	5mg
ガスター注	20mg
生食	50mL

③
点滴静注

生食	50mL
----	------

④
点滴静注

ジェブタナ	25mg/m ²
生食	250mL

⑤
点滴静注

生食	50mL
----	------

フィルター必要
バッグ、ルートともに遮光不
濃度<0.1mg/mLのとき生食
100mL,
>0.26mg/mLのとき生食500mL