レジメン名	(BS)R-mini CHOP(2コース目以降)				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少		
	貧血		
その他	IR		
	悪心・嘔吐		
	末梢神経障害		

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●																				
2	ボララミン 生食	5mg 50ml	点滴静注	100ml/h		●																				
3	リツキシマブBS 生理食塩液	375mg/m2 337.5mL/m2	点滴静注	100mg/hから開始可、医師の指示により30分毎100mg/hずつ上げて400mg/hまで		●																				
4	オンコビン 生食	1mg 50ml	点滴静注	500ml/h		●																				
5	ドキソルビシン 生食	25mg/㎡ 100ml	点滴静注	200ml/h		●																				
6	エンドキサン 生食	400mg/㎡ 250ml	点滴静注	250ml/h		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	プレドニゾロン	50mg/回	1日2回			●●	●●	●●	●●	●●																
2	カイトリル	2mg	化学療法前			●																				
3	イブプロフェン	200mg	化学療法前			●																				