| レジメン名 | 2コース目Nivolumab+CBDCA+PTX | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象がん種 | 肺がん | 対象患者 | 初発 | 催吐リスク | 中等度 |
| | | | 切除不能進行・再発 | 1コースの日数 | 21日 |
| | | | | 投与予定回数 | 1 |
| 内服抗がん剤の有無 | なし | | | 投与回数上限 | |
| ※有の場合薬剤名 | | | | | |

| 副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など） | | | |
|---|---|---|---|
| 項目 | | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など) |
| 血液毒性 | 血液リンパ系障害 | 31.0% | G-CSF，輸血 |
| | | | |
| | | | |
| その他 | 皮膚毒性 | 46.6% | 適正使用ガイドに準ずる |
| | 内分泌障害 | 22.1% | 適正使用ガイドに準ずる |
| | 胃腸障害 | 49.2% | 適正使用ガイドに準ずる |

レジメン内容（支持療法を含む）

| | | | | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 投与時刻(必要時) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 1 | 生食 | 50ml | 点滴静注 | 100ml/hr | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | オプジーボ<br>生食 | 360mg<br>100ml | 点滴静注 | 1時間 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生食 | 50ml | 点滴静注 | 200ml/hr | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生食<br>ブロイメンド | 100ml<br>150mg | 点滴静注 | 200ml/hr | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生食 | 50mL | 点滴静注 | 200mL/hr | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 生食<br>デキサート<br>アロキシ<br>ガスター注<br>ボララミン | 100ml<br>9.9mg<br>0.75mg<br>20mg<br>5mg | 点滴静注 | 200ml/hr | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 生食 | 50ml | 点滴静注 | 100ml/hr | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ブドウ糖5%<br>パクリタキセル | 500ml<br>200mg/m2 | 点滴静注 | 3時間 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ブドウ糖5%<br>カルボプラチン | 250ml<br>AUC：6 | 点滴静注 | 1時間 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 生食 | 50ml | 点滴静注 | 200ml/hr | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デカドロン錠 | 4～8mg/day | | | | | ●● | ●● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |