

レジメン名		PER+HER+DOC初回			
対象がん種	乳がん	対象患者	術前化学療法	嘔吐リスク	軽度
			術後化学療法	1コースの日数	21日
内服抗がん剤の有無 ※有の場合薬剤名	なし		切除不能進行・再	投与予定回数	1回
				投与回数上限	なし

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	52.8%
	発熱性好中球減少	13.8%
		0.0%
その他	下痢	66.8%
	悪心	42.3%
	Infusion reaction	頻度不明

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	生理食塩液	50 ml	点滴静注	100 ml/h				●																					休薬完了
	バジェタ	840 mg	点滴静注	250 ml/h				●																					
	生理食塩液	250 ml						●																					
2	ハーセプチン	8 mg/kg	点滴静注	90分				●																					
	生理食塩液	250 ml						●																					
3	生理食塩液	100 ml	点滴静注	100 ml/h				●																					
4	ボラミン	5 mg	点滴静注																										
	デキサート	6.6 mg	点滴静注	200 ml/h				●																					
	生理食塩液	50 ml						●																					
5	ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間				●																					
	5%ブドウ糖液	250 ml						●																					
6	生理食塩液	50 ml		100 ml/h				●																					

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	デカドロン錠	8 mg/日	1日2回		●●		●●	●●																				

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

① 点滴静注

生理食塩液	50 ml
	100 ml/h

② 点滴静注

バジェタ	840 mg
生理食塩液	50 ml
	250 ml/h

軽度炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

③ 点滴静注

ハーセプチン	8 mg/kg
生理食塩液	250 ml
	90分

軽度炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

④ 点滴静注

生理食塩液	100 ml
	100 ml/h

⑤ 点滴静注

ボラミン	5 mg
デキサート	6.6 mg
生理食塩液	50 ml
	300 ml/h

⑥ 点滴静注

ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>
5%ブドウ糖液	250 ml
	1時間

起壊死性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

⑦ 点滴静注

生理食塩液	50 ml
	100 ml/h