レジメン名	CDDP+CPT-11小細胞肺がん				
対象がん種	肺がん	対象患者		催吐リスク	高度
				1コースの日数	4週間
				投与予定回数	3～4コース
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	38.0%	G-CSF製剤投与
	血小板減少	9.0%	輸血
	貧血	38.0%	
その他	悪心・嘔吐	28.0%	制吐剤の使用
	下痢	21.0%	下痢止めの使用
	発熱	17.0%	解熱剤の使用

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●							●							●													
2	ソルデム3A	500mL	点滴静注	250mL/h		●																											
3	ソリューゲンG アスパラギン酸K注キット 硫酸Mg	500mL 1キット 10mL	点滴静注	260mL/h		●																											
4	プロイメンド 生食	150mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●																											
5	デキサート アロキシ 生食	9.9mg 0.75mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●																											
6	デキサート 生食	9.9mg 100mL	点滴静注	200mL/h									●							●													
7	20%マンニットール	300mL	点滴静注	300mL/h		●																											
8	シスプラチン 生食	60mg/㎡ 250mL	点滴静注	1時間30分		●																											
9	イリノテカン 生食	60mg/㎡ 500mL	点滴静注	1時間30分		●							●							●													
10	ソリューゲンG	500mL	点滴静注	250mL/h		●																											
11	ソルデム3A	500mL	点滴静注	250mL/h		●																											
12	生食	50mL	点滴静注	200mL/h									●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	デカドロン錠	4mg 2錠	朝・昼食後				●●	●●																									