レジメン名	イリノテカン単剤療法(B法)				
対象がん種	胃がん	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	14日間
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	白血球減少	33.5%	
	血小板減少	15.3%	
	貧血	54.8%	
その他	悪心・嘔吐	74.1%	
	下痢	61.9%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●													
2	デキサート アロキシ 生食	9.9mg 0.75mg 100ml	点滴静注	200ml/h		●													
3	イリノテカン 5%ブドウ糖液	150mg/㎡ 250ml	点滴静注	90分		●													
4	生食	50ml	点滴静注	200ml/h		●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	デカドロン錠	4mg	朝・昼食後				●●	●●											