

レジメン名	FEC 3週毎			
対象がん種	乳がん	対象患者	術前化学療法	催吐リスク
			1コースの日数	21日
			再発	投与予定回数
			投与回数上限	4~6
※有の場合薬剤名				

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度%(Grade≥3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	33.6%
	発熱性好中球減少	8.4%
		0.0%
その他	嘔吐	20.5%
	心障害	1.3%
	口内炎	4.0%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 生食	デキサート ガスター アロキシ 生食	50 ml 9.9 mg 20 mg 0.75 mg 100 ml	点滴静注	100 ml/h		●																			休薬完了	
2 生食							●																			
3 生食	エビルビシン 生食	100 mg/m <sup>2</sup> 100 ml	点滴静注	500 ml/h		●																				
4 生食						●																				
5 生食	エンドキサン フルオロウラシル 生食	500 mg/m <sup>2</sup> 500 mg/m <sup>2</sup> 250 ml	点滴静注	1時間		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 イメンドカプセル		125 mg/回	投与1~1時間30分前		●																				
2 イメンドカプセル		80 mg/回	午前中		●	●																			
3 デカドロン錠		4 mg/回	朝・夕食後		●●	●●	●●																		

滴下順

主管  
投与方法

薬剤・用量	生食	50 ml
		100 ml/h

②	デキサート ガスター アロキシ 生食	9.9 mg 20 mg 0.75 mg 100 ml
		200 ml/h

③	エビルビシン 生食	100 mg/m <sup>2</sup> 100 ml
		500 ml/h

④	生食	100 ml
		500 ml/h

⑤	エンドキサン フルオロウラシル 生食	500 mg/m <sup>2</sup> 500 mg/m <sup>2</sup> 250 ml
		1時間

投与速度/時間  
投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

起壊死性  
フィルター不要  
バッグ、ルートとともに遮光不要

炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートとともに遮光不要