ID	患者名	性別	生年月日	年齢	身長		体重		体表面積		医師名
					測定日		測定日		測定日		
@PATIENTID	@PATIENTNAME	PATIENTSE	@PATIENTBIRTH	NTAGEFORI	HEIGHT01_D	cm	HEIGHT01_D	kg	#VALUE!	m^2	@USERNAME
					$HEIGHT02_Doc		$WHEIGHT02_Doc		1900/1/0		

レジメン名	GEM＋nab-PTX				
対象がん種	膵がん	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	28日
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)(grade≧3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少		
	血小板減少		
	貧血		
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生食	50 mL	点滴静注	200 ml/h		●							●							●													
2	デキサート 生食	6.6mg 50mL	点滴静注	100ml/h		●							●							●													
3	アプラキサン 生食	125mg/㎡ 25mL/㎡	点滴静注	30分		●							●							●													
4	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●							●							●													
5	生食 ゲムシタビン	100 mL 1000mg/㎡	点滴静注	200 ml/h		●							●							●													
6	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●							●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																																