レジメン名	RAM＋nab-PTX療法				
対象がん種	胃がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	なし
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	76.7%(grade 3以上)	減量、中止、延期
	白血球減少	27.9%(grade 3以上)	減量、中止、延期
	貧血	11.6%(grade 3以上)	減量、中止、延期
その他	食欲減退	7%(grade 3以上)	減量、中止、延期
	高血圧	4.7%(grade 3以上)	減量、中止、延期

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●							●							●													
2	ボララミン デキサート 生食	5mg 6.6mg 50ml	点滴静注	100ml/h		●														●													
2	デキサート 生食	6.6mg 50ml	点滴静注	100ml/h									●																				
3	サイラムザ 生食	8mg/kg 250ml	点滴静注	1時間 （2回目以降 500ml/hまで短縮可）		●														●													
4	生食	100ml	点滴静注	1～2コース目 100ml/hr、3コース目以降 400mL/hrでも可		●							●							●													
5	アブラキサン 生食	100mg/㎡ 20mL/㎡	点滴静注	30分		●							●							●													
6	生食	50ml	点滴静注	100 ml/h		●							●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																																