

レジメン名	アテゾリズマブ+CBDCa+PTX+BV(ﾊﾞｼﾞｽﾞﾏﾌﾞ)			
対象がん種	肺がん	対象患者	除不能進行・再発再発リスク	中等度
			1コースの日数	21
			投与予定回数	4
内服抗がん剤の有無	なし		投与回数上限	6
※有の場合薬剤名				

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	血小板減少	13.7%
	好中球減少	12.2%
	貧血	24.7%
その他	末梢性ニューロパ	22.4%
	高血圧	19.8%
	免疫関連重篤事象	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●																					休薬完了	
2	テセントリク 生食	1200mg 250mL	点滴静注	初回250mL/h 2回目以降 500mL/h			●																						
3	生食	50mL	点滴静注	200mL/h			●																						
4	ベバシズマブ 生食	15mg/kg 100mL	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分			●																						
5	プロイメンド 生食	150mg 100mL	点滴静注	200mL/h			●																						
6	デキサート アロキシ ガスター注 ボタラミン注 生食	9.9mg 0.75mg 20mg 5mg 100mL	点滴静注	200mL/h			●																						
7	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●																						
8	バクリタキセル 5%ブドウ糖注	200mg/m ² 500mL	点滴静注	180mL/h			●																						
9	カルボプラチン 5%ブドウ糖注	AUC=6 250mL	点滴静注	250mL/h			●																						
10	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●																						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	デキドロソド錠	4mg/回	朝食後			●																				

主管

投与方法	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
投与方法	点滴静注	点滴静注	点滴静注	点滴静注	点滴静注	点滴静注	点滴静注	点滴静注	点滴静注	点滴静注
薬剤・用量	生食 50mL	テセントリク 1200mg 生食 250mL	生食 50mL	ベバシズマブ 15mg/kg 生食 100mL	プロイメンド 150mg 生食 100mL	デキサート 9.9mg アロキシ 0.75mg ガスター注 20mg ボタラミン注 5mg 生食 100mL	生食 50mL	バクリタキセル 200mg/m ² 5%ブドウ糖注 500mL	カルボプラチン AUC=6 5%ブドウ糖注 250mL	生食 50mL
投与速度/時間	100 ml/h	備考欄参照	200 ml/h	備考欄参照	200 ml/h	200 ml/h	100 ml/h	備考欄参照	250 ml/h	100 ml/h
投与時刻(必要時)										
漏出時リスク										
フィルター		フィルター必要		フィルター不要				フィルター必要	フィルター不要	
遮光		バッグ、ルートともに遮光不要		バッグ、ルートともに遮光不要				バッグ、ルートともに遮光不要	バッグ、ルートともに遮光不要	
備考		初回250mL/h,2回目以降500mL/h		初回90分,2回目60分, 3回目以降30分				180mL/h(3時間)		