レジメン名	wPAC(パクリタキセル)				
対象がん種	胃がん	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	28日
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少		
	白血球減少		
その他	末梢神経障害		
	脱毛		

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●							●							●													
2	ガスター ボララミン デキサート 生食	20mg 5mg 6.6mg 50ml	点滴静注	300ml/h		●							●							●													
3	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●							●							●													
4	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	80mg/㎡ 250ml	点滴静注	1時間		●							●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																																