採用薬品一覧

2026/10/21 現在

処方箋に表示される薬剤名	一般名	採用区分
[覚]エフピーOD錠2.5mg	塩酸セレギリン	院外採用
【4回分】ウゴービ皮下注０．２５mgﾍﾟﾝ1.0MD	セマグルチド	院外採用
【4回分】ウゴービ皮下注０．５mgﾍﾟﾝ2.0MD	セマグルチド	院外採用
【4回分】ウゴービ皮下注１．０mgﾍﾟﾝ4.0MD	セマグルチド	院外採用
【4回分】ウゴービ皮下注１．７mgﾍﾟﾝ6.8MD	セマグルチド	院外採用
【4回分】ウゴービ皮下注２．４mgﾍﾟﾝ9.6MD	セマグルチド	院外採用
【般】L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸Ca錠200mg(参考：ｱｽﾊﾟﾗCa)	L-アスパラギン酸カルシウム	院外採用
【般】アシクロビル軟膏5% 5g/本(参考:ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ軟膏)	アシクロビル	院外採用
【般】アシクロビル顆粒400mg/g(参考:ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ)	アシクロビル	院外採用
【般】アジスロマイシン錠250mg(参考:ｼﾞｽﾛﾏｯｸ)	アジスロマイシン水和物	院外採用
【般】アジルサルタン錠20ｍｇ（参考：アジルバ）	アジルサルタン	院外採用
【般】アジルサルタン錠40ｍｇ（参考：アジルバ）	アジルサルタン	院外採用
【般】ｱｽﾋﾟﾘﾝ81mg・ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ配合錠（参考ﾊﾞﾌｧﾘﾝA81）	ｱｽﾋﾟﾘﾝ81mg・ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ	院外採用
【般】ｱｽﾞﾚﾝ点眼液0.02%5mL(参考:AZ点眼)	アズレン	院外採用
【般】アセトアミノフェン錠300mg(参考:ｶﾛﾅｰﾙ)	アセトアミノフェン	院外採用
【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg（参考：ｱｾﾞﾌﾟﾁﾝ）	塩酸アゼラスチン	院外採用
【般】アゼルニジピン錠16mg(参考:ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ)	アゼルニジピン	院外採用
【般】アゾセミド錠６０mg(参考:ﾀﾞｲｱｰﾄ)	アゾセミド	院外採用
【般】アテノロール錠25mg(参考:ﾃﾉｰﾐﾝ)	アテノロール	院外採用
【般】アテノロール錠50mg(参考:ﾃﾉｰﾐﾝ)	アテノロール	院外採用
【般】アトモキセチンカプセル１０mg(参考：ｽﾄﾗﾃﾗ)	アトモキセチン塩酸塩	院外採用
【般】アトモキセチンカプセル２５mg(参考：ｽﾄﾗﾃﾗ)	アトモキセチン塩酸塩	院外採用
【般】アトモキセチンカプセル４０mg(参考：ｽﾄﾗﾃﾗ)	アトモキセチン塩酸塩	院外採用
【般】アトモキセチンカプセル５mg(参考：ｽﾄﾗﾃﾗ)	アトモキセチン塩酸塩	院外採用
【般】アトルバスタチン錠10mg(参考:ﾘﾋﾟﾄｰﾙ)	アトルバスタチンカルシウム	院外採用
【般】アトルバスタチン錠5mg(参考:ﾘﾋﾟﾄｰﾙ)	アトルバスタチンカルシウム	院外採用
【般】アナストロゾール錠1mg(参考:ｱﾘﾐﾃﾞｯｸｽ)	アナストロゾール	院外採用
【般】ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ2.5・ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ10錠(参考:ｶﾃﾞｭｴｯﾄ2番)	ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ2.5mg・ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ10mg	院外採用
【般】ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5・ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ10配合錠(参考:ｶﾃﾞｭｴｯﾄ4番)	ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5mg・ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ10mg	院外採用
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠10mg(参考:ｱﾑﾛｼﾞﾝ)	アムロジピンベシル	院外採用
【般】ｱﾒｼﾞﾆｳﾑﾒﾁﾙ硫酸塩錠10mg(参考:ﾘｽﾞﾐｯｸ)	アメジニウムメチル硫酸塩	院外採用
【般】ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ経口液0.1% 1mL/包(参考:ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ)	アリピプラゾール	院外採用
【般】ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ経口液0.1% 3mL/包(参考:ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ)	アリピプラゾール	院外採用
【般】アリピプラゾール錠12mg（参考：ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ）	アリピプラゾール	院外採用
【般】アリピプラゾール錠1mg（参考：ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ）	アリピプラゾール	院外採用
【般】アリピプラゾール錠3mg（参考：ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ）	アリピプラゾール	院外採用
【般】アリピプラゾール錠6mg（参考：ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ）	アリピプラゾール	院外採用
【般】ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μg(参考：ｱﾙﾌｧﾛｰﾙ)	アルファカルシドール	院外採用
【般】ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1μg(参考：ｱﾙﾌｧﾛｰﾙ)	アルファカルシドール	院外採用
【般】ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ錠0.5μg(参考：ﾜﾝｱﾙﾌｧ)	アルファカルシドール	院外採用
【般】アレンドロン酸錠35mg(参考:ﾌｫｻﾏｯｸ/ﾎﾞﾅﾛﾝ)	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外採用
【般】アロプリノール錠100mg(参考:ｻﾞｲﾛﾘｯｸ)	アロプリノール	院外採用
【般】ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩徐放錠45mg(参考:ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝL)	アンブロキソール塩酸塩	院外採用
【般】ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ600mg（参考:ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙ）	イコサペント酸エチル	院外採用
【般】ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ900mg（参考:ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙ）	イコサペント酸エチル	院外採用
【般】イマチニブ錠１００ｍｇ(参考:ｸﾞﾘﾍﾞｯｸ)	イマチニブメシル酸塩	院外採用
【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg(参考:ｳﾘﾄｽ)	イミダフェナシン	院外採用

【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg（参考：ﾀﾅﾄﾘﾙ）	イミダプリル	院外採用
【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg（参考：ﾀﾅﾄﾘﾙ）	イミダプリル	院外採用
【般】ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ10mg配合錠(参考:ｱｲﾐｸｽHD)	ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩	院外採用
【般】ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5mg配合錠(参考:ｱｲﾐｸｽLD)	ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩	院外採用
【般】イルベサルタン錠100mg(参考:ｱﾊﾞﾌﾟﾛ)	イルベサルタン	院外採用
【般】イルベサルタン錠50mg(参考:ｱﾊﾞﾌﾟﾛ)	イルベサルタン	院外採用
【般】ｲﾝｽﾘﾝｱｽﾊﾟﾙﾄ注ﾍﾟﾝ300単位（参考：ﾉﾎﾞﾗﾋﾞｯﾄﾞ）	インスリンアスパルト	院外採用
【般】ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾛ注100単位/mL（参考：ﾋｭｰﾏﾛｸﾞ）	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾛ(遺伝子組換え)	院外採用
【般】ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾛ注ﾍﾟﾝ型ｷｯﾄ300単位(参考ﾋｭｰﾏﾛｸﾞ）	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾛ(遺伝子組換え)	院外採用
【般】エスシタロプラム錠10mg（参考：レクサプロ）	エスシタロプラムシュウ酸塩	院外採用
【般】エスゾピクロン錠1mg(参考:ﾙﾈｽﾀ)	エスゾピクロン	院外採用
【般】エスタゾラム錠2mg(参考:ﾕｰﾛｼﾞﾝ)	エスタゾラム	院外採用
【般】ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ・ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ10mg錠(参考:ｱﾄｰｾﾞｯﾄLD)	ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ・ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和物	院外採用
【般】ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ・ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ20mg錠(参考:ｱﾄｰｾﾞｯﾄHD)	ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ・ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和物	院外採用
【般】ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ・ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ5mg配合錠(参考：ﾛｽｰｾﾞｯﾄ)	エゼチミブ・ロスバスタチンカル	院外採用
【般】エゼチミブ錠10mg(参考:ｾﾞﾁｰｱ)	エゼチミブ	院外採用
【般】エソメプラゾールｶﾌﾟｾﾙ10mg（参考：ﾈｷｼｳﾑ）	エソメプラゾール	院外採用
【般】エソメプラゾールｶﾌﾟｾﾙ20mg(参考：ﾈｷｼｳﾑ)	エソメプラゾール	院外採用
【般】ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ注射用ﾍﾟﾝ型ｷｯﾄ50mg（参考：ｴﾝﾌﾞﾚﾙ）	エタネルセプト（遺伝子組換え）	院外採用
【般】エチゾラム錠1mg(参考:ﾃﾞﾊﾞｽ)	エチゾラム	院外採用
【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mg（参考：ｴﾊﾞｽﾃﾙ）	エバスチン	院外採用
【般】エバスチン口腔内崩壊錠5mg（参考：ｴﾊﾞｽﾃﾙ）	エバスチン	院外採用
【般】エパルレスタット錠50mg(参考:ｷﾈﾀﾞｯｸ)	エパルレスタット	院外採用
【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg（参考：ｱﾚｼﾞｵﾝ）	塩酸エピナスチン	院外採用
【般】ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ点眼液0.05% 5mL(参考:ｱﾚｼﾞｵﾝ)	エピナスチン	院外採用
【般】エプレレノン錠25mg（参考:セララ）	エプレレノン	院外採用
【般】エプレレノン錠50mg（参考:セララ）	エプレレノン	院外採用
【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg(参考:ﾐｵﾅｰﾙ)	エペリゾン塩酸塩	院外採用
【般】ｴﾙﾃﾞｶﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.75μg（参考:ｴﾃﾞｨﾛｰﾙ）	エルデカルシトール	院外採用
【般】エレトリプタン錠20mg(参考：ﾚﾙﾊﾟｯｸｽ)	エレトリプタン臭化水素酸塩	院外採用
【般】エンタカポン錠100mg(参考：ｺﾑﾀﾝ)	エンタカポン	院外採用
【般】エンテカビル錠0.5mg(参考:ﾊﾞﾗｸﾙｰﾄﾞ）	エンテカビル水和物	院外採用
【般】ｵﾒｶﾞ-3脂肪酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ2g(参考:ﾛﾄﾘｶﾞ）	オメガ-3脂肪酸エチルカプセル	院外採用
【般】オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg(参考:ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ)	オランザピン	院外採用
【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg(参考:ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ)	オランザピン	院外採用
【般】オランザピン細粒10mg/g(参考：ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ)	オランザピン	院外採用
【般】ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ口腔内崩壊錠10mg(参考:ｵﾙﾒﾃｯｸ)	オルメサルタン　メドキソミル	院外採用
【般】ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ口腔内崩壊錠20mg(参考:ｵﾙﾒﾃｯｸ)	オルメサルタン　メドキソミル	院外採用
【般】ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ口腔内崩壊錠40mg(参考:ｵﾙﾒﾃｯｸ)	オルメサルタン　メドキソミル	院外採用
【般】ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠5mg(参考:ｱﾚﾛｯｸ)	オロパタジン塩酸塩	院外採用
【般】オロパタジン塩酸塩顆粒5mg/g(参考:ｱﾚﾛｯｸ)	オロパタジン	院外採用
【般】ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ点眼液0.1% 5mL(参考:ﾊﾟﾀﾉｰﾙ)	オロパタジン塩酸塩	院外採用
【般】カペシタビン錠300mg(参考:ｾﾞﾛﾀﾞ）	カペシタビン	院外採用
【般】カモスタットﾒｼﾙ酸塩錠100mg(参考:ﾌｵｲﾊﾞﾝ)	カモスタットメシル酸塩	院外採用
【般】カリジノゲナーゼ錠25単位(参考:ｶﾙﾅｸﾘﾝ)	カリジノゲナーゼ	院外採用
【般】カリジノゲナーゼ錠５０単位(参考:ｶﾙﾅｸﾘﾝ)	カリジノゲナーゼ	院外採用
【般】カルバゾクロムｽﾙﾎﾝ酸Na錠30mg(参考:ｱﾄﾞﾅ)	ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物	院外採用
【般】カルベジロール錠10mg(参考:ｱｰﾁｽﾄ)	カルベジロール	院外採用
【般】ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5mg配合錠(参考:ﾕﾆｼｱHD)	ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ､ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ配合剤	院外採用
【般】ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ8・ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合錠(参考:ｴｶｰﾄﾞHD)	ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ,ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合剤	院外採用
【般】カンデサルタン錠2mg(参考:ﾌﾟﾛﾌﾟﾚｽ)	カンデサルタン　シレキセチル	院外採用
【般】カンデサルタン錠4mg(参考:ﾌﾟﾛﾌﾟﾚｽ)	カンデサルタン　シレキセチル	院外採用

【般】カンデサルタン錠8mg(参考:ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ)	カンデサルタン　シレキセチル	院外採用
【般】クエチアピン細粒50%(参考：ｾﾛｸｴﾙ)	クエチアピンフマル酸塩	院外採用
【般】クエチアピン錠100mg(参考：ｾﾛｸｴﾙ)	クエチアピンフマル酸塩	院外採用
【般】クエチアピン錠12.5mg（参考：ｾﾛｸｴﾙ)	クエチアピンフマル酸塩	院外採用
【般】クエチアピン錠200mg（参考：ｾﾛｸｴﾙ)	クエチアピンフマル酸	院外採用
【般】クエチアピン錠25mg(参考：ｾﾛｸｴﾙ)	クエチアピンフマル酸塩	院外採用
【般】グラニセトロン経口ｾﾞﾘｰ２mg（参考：ｶｲﾄﾘﾙ)	グラニセトロン塩酸塩	院外採用
【般】クラリスロマイシン錠50mg(参考：ｸﾗﾘｽ)	クラリスロマイシン	院外採用
【般】グリクラジド錠40mg(参考:ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ)	グリクラジド	院外採用
【般】グリメピリド錠0.5mg（参考：アマリール）	グリメピリド	院外採用
【般】グリメピリド錠３mg（参考：アマリール）	グリメピリド	院外採用
【般】クロトリマゾールｸﾘｰﾑ1% 10ｇ(参考:ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞ)	クロトリマゾール	院外採用
【般】クロトリマゾール腟錠100mg(参考:ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞ)	クロトリマゾール	院外採用
【般】クロピドグレル錠25mg(参考:ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ)	クロピドグレル硫酸塩	院外採用
【般】クロピドグレル錠75mg(参考:ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ)	クロピドグレル硫酸塩	院外採用
【般】ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙｸﾘｰﾑ0.05% 5g/本(参考：ﾃﾞﾙﾓﾍﾞｰﾄ)	プロピオン酸クロベタゾール	院外採用
【般】ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙ外用液0.05% 10g/本(参考:ﾃﾞﾙﾓﾍﾞｰﾄ)	プロピオン酸クロベタゾール	院外採用
【般】ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙ軟膏0.05% 5g/本(参考:ﾃﾞﾙﾓﾍﾞｰﾄ軟膏)	クロベタゾールプロピオン酸エス	院外採用
【般】ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ20mg(温感)7枚/袋(参考:ﾓｰﾗｽ)	ケトプロフェン	院外採用
【般】ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ20mg(非温感)7枚/袋(参考:ﾓｰﾗｽ)	ケトプロフェン	院外採用
【般】ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ40mg(温感)7枚/袋(参考:ﾓｰﾗｽ)	ケトプロフェン	院外採用
【般】ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ40mg(非温感)7枚/袋(参考:ﾓｰﾗｽ)	ケトプロフェン	院外採用
【般】ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾊﾟｯﾌﾟ120mg(非温感)7枚/袋(参考:ﾓｰﾗｽ)	ケトプロフェン	院外採用
【般】ゲフィチニブ錠250mg(参考:ｲﾚｯｻ)	ゲフィチニブ	院外採用
【般】ザルトプロフェン錠８０ｍｇ（参考：ソレトン）	ザルトプロフェン	院外採用
【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg(参考:ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ)	サルポグレラート塩酸塩	院外採用
【般】ジアゼパム錠2mg(参考:ｾﾙｼﾝ/ﾎﾘｿﾞﾝ)	ジアゼパム	院外採用
【般】ジアゼパム錠5mg(参考:ｾﾙｼﾝ/ﾎﾘｿﾞﾝ)	ジアゼパム	院外採用
【般】ジエノゲスト錠0.5mg(参考:ディナゲスト)	ジエノゲスト	院外採用
【般】ジエノゲスト錠1mg(参考:ディナゲスト)	ジエノゲスト	院外採用
【般】シクロスポリンカプセル10mg(参考:ﾈｵｰﾗﾙ)	シクロスポリン	院外採用
【般】シクロスポリンカプセル25mg(参考:ﾈｵｰﾗﾙ)	シクロスポリン	院外採用
【般】ジクロフェナクNaゲル1% 25g(参考:ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ)	ジクロフェナクナトリウム	院外採用
【般】ジクロフェナクNa錠25mg(参考:ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ)	ジクロフェナクナトリウム	院外採用
【般】ジピリダモール錠25mg(参考:ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ)	ジピリダモール	院外採用
【般】ｼﾞﾌﾙｺﾙﾄﾛﾝ・ﾘﾄﾞｶｲﾝ配合坐剤(参考ﾈﾘﾌﾟﾛｸﾄ)	ｼﾞﾌﾙｺﾙﾄﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ・ﾘﾄﾞｶｲﾝ	院外採用
【般】シベンゾリンｺﾊｸ酸塩錠100mg（参考:ｼﾍﾞﾉｰﾙ)	シベンゾリンコハク酸塩	院外採用
【般】ジメチコン錠４０ｍｇ(参考:ｶﾞｽｺﾝ)	ジメチコン	院外採用
【般】ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200ｍｇ(参考:ﾀｶﾞﾒｯﾄ)	シメチジン	院外採用
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg(参考:ﾌﾟﾚﾀｰﾙ)	シロスタゾール	院外採用
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg(参考:ﾌﾟﾚﾀｰﾙ)	シロスタゾール	院外採用
【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg(参考:ﾕﾘｰﾌ)	シロドシン	院外採用
【般】シンバスタチン錠5mg(参考:ﾘﾎﾟﾊﾞｽ)	シンバスタチン	院外採用
【般】スピロノラクトン錠25mg(参考:ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝ)	スピロノラクトン	院外採用
【般】スマトリプタン錠50mg(参考:ｲﾐｸﾞﾗﾝ)	コハク酸スマトリプタン	院外採用
【般】スルピリド錠50ｍｇ（参考：ドグマチール）	スルピリド	院外採用
【般】ｾﾁﾘｼﾞﾝｼﾛｯﾌﾟ用1.25% 12.5mg/g(参考:ｼﾞﾙﾃｯｸDS)	セチリジン塩酸塩	院外採用
【般】セチリジン塩酸塩錠10mg（参考：ｼﾞﾙﾃｯｸ)	塩酸セチリジン	院外採用
【般】ｾﾙﾄﾗﾘﾝ口腔内崩壊錠25mg(参考:ｼﾞｪｲﾌﾞﾛﾌﾄ)	セルトラリン塩酸塩	院外採用
【般】セレコキシブ錠100mg(参考:ｾﾚｺｯｸｽ)	セレコキシブ	院外採用
【般】センノシド錠12mg(参考：ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞ)	センノシド	院外採用
【般】ソタロール錠40ｍｇ(参考:ｿﾀｺｰﾙ)	ソタロール塩酸塩	院外採用

【般】ゾピクロン錠７．５ｍｇ(参考：ｱﾓﾊﾞﾝ)	ゾピクロン	院外採用
【般】ｿﾘﾌｪﾅｼﾝｺﾊｸ酸塩口腔内崩壊錠2.5mg(参考:ﾍﾞｼｹｱ)	コハク酸ソリフェナシン	院外採用
【般】ｿﾘﾌｪﾅｼﾝｺﾊｸ酸塩口腔内崩壊錠5mg(参考:ﾍﾞｼｹｱ)	コハク酸ソリフェナシン	院外採用
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg(参考：ﾏｲｽﾘｰ)	ゾルピデム酒石酸塩	院外採用
【般】ｿﾞﾙﾐﾄﾘﾌﾟﾀﾝ口腔内崩壊錠2.5mg(参考:ｿﾞｰﾐｯｸﾞRM)	ゾルミトリプタン	院外採用
【般】ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg(参考:ﾊﾙﾅｰﾙ)	タムスロシン	院外採用
【般】ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg(参考:ﾊﾙﾅｰﾙ)	タムスロシン	院外採用
【般】タルチレリン錠5mg(参考：ｾﾚｼﾞｽﾄ)	タルチレリン水和物	院外採用
【般】タンドスピロン錠10mg（参考:ｾﾃﾞｨｰﾙ)	タンドスピロンクエン酸塩	院外採用
【般】チキジウム臭化物ｶﾌﾟｾﾙ10mg（参考:ﾁｱﾄﾝ)	チキジウム臭化物	院外採用
【般】チザニジン錠1mg(参考:ﾃﾙﾈﾘﾝ)	チザニジン塩酸塩	院外採用
【般】テオフィリンシロップ用20% 200mg/g	テオフィリン	院外採用
【般】ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸塩錠15mg(参考:ﾒｼﾞｺﾝ)	デキストロメトルファン臭化水素	院外採用
【般】テモゾロミドｶﾌﾟｾﾙ100mg(参考:ﾃﾓﾀﾞｰﾙ)	テモゾロミド	院外採用
【般】テモゾロミドｶﾌﾟｾﾙ20mg(参考:ﾃﾓﾀﾞｰﾙ)	テモゾロミド	院外採用
【般】デュロキセチンｶﾌﾟｾﾙ20mg(参考:ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀ)	デュロキセチン塩酸塩	院外採用
【般】ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ注射用ｷｯﾄ600μg（参考:フォルテオ）	ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ（遺伝子組換え）	院外採用
【般】ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩ｸﾘｰﾑ1% 10g/本(参考:ﾗﾐｼｰﾙ)	塩酸テルビナフィン	院外採用
【般】テルビナフィン錠125mg(参考:ﾗﾐｼｰﾙ)	テルビナフィン塩酸塩	院外採用
【般】ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ40・ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合錠(参考:ﾐｺﾝﾋﾞAP)	ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ,ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合錠	院外採用
【般】ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ40mg・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ配合錠(参考ﾐｶﾑﾛAP)	ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ40mg・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5mg	院外採用
【般】ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ80mg・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ配合錠(参考ﾐｶﾑﾛBP)	ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ80mg・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5mg	院外採用
【般】テルミサルタン錠20mg(参考:ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ)	テルミサルタン	院外採用
【般】テルミサルタン錠40mg(参考:ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ)	テルミサルタン	院外採用
【般】ドキサゾシンﾒｼﾙ酸塩錠1mg(参考:ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ)	ドキサゾシンメシル酸塩	院外採用
【般】ドキサゾシンﾒｼﾙ酸塩錠2mg(参考:ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ)	ドキサゾシン	院外採用
【般】ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg(参考:ﾕﾍﾞﾗN)	トコフェロールニコチン酸エステ	院外採用
【般】トコフェロール酢酸ｴｽﾃﾙ錠50mg(参考:ﾕﾍﾞﾗ)	トコフェロール酢酸エステル	院外採用
【般】ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ口腔内崩壊錠10mg（参考:ｱﾘｾﾌﾟﾄD）	ドネペジル	院外採用
【般】ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ口腔内崩壊錠3mg（参考:ｱﾘｾﾌﾟﾄD）	ドネペジル	院外採用
【般】ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ口腔内崩壊錠5mg（参考:ｱﾘｾﾌﾟﾄD）	ドネペジル	院外採用
【般】トラセミド錠４mg(参考:ﾙﾌﾟﾗｯｸ)	トラセミド	院外採用
【般】トラネキサム酸ｶﾌﾟｾﾙ250mg(参考:ﾄﾗﾝｻﾐﾝ)	トラネキサム酸	院外採用
【般】トラネキサム酸錠250mg(参考:ﾄﾗﾝｻﾐﾝ)	トラネキサム酸	院外採用
【般】トラネキサム酸錠500mg(参考:ﾄﾗﾝｻﾐﾝ)	トラネキサム酸	院外採用
【般】ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ・ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ配合錠(参考:ﾄﾗﾑｾｯﾄ)	ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩・ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ	院外採用
【般】トラマドール口腔内崩壊錠25mg(参考:ﾄﾗﾏｰﾙ)	トラマドール塩酸塩	院外採用
【般】トリアゾラム錠0.125mg(参考：ﾊﾙｼｵﾝ)	トリアゾラム	院外採用
【般】トリアゾラム錠0.25mg(参考：ﾊﾙｼｵﾝ)	トリアゾラム	院外採用
【般】トリクロルメチアジド錠1mg(参考:ﾌﾙｲﾄﾗﾝ)	トリクロルメチアジド	院外採用
【般】トリクロルメチアジド錠2mg(参考:ﾌﾙｲﾄﾗﾝ)	トリクロルメチアジド	院外採用
【般】ﾄﾞﾙｿﾞﾗﾐﾄﾞ・ﾁﾓﾛｰﾙ配合点眼液 5mL（参考:ｺｿﾌﾟﾄ）	塩酸ﾄﾞﾙｿﾞﾗﾐﾄﾞ/ﾏﾚｲﾝ酸ﾁﾓﾛｰﾙ	院外採用
【般】ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾛｯﾌﾟ用10mg/g(参考:ﾅｳｾﾞﾘﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ)	ドンペリドン	院外採用
【般】ドンペリドン錠10mg(参考：ﾅｳｾﾞﾘﾝ)	ドンペリドン	院外採用
【般】ナジフロキサシンｸﾘｰﾑ1% 10g(参考:ｱｸｱﾁﾑ)	ナジフロキサシン	院外採用
【般】ナジフロキサシン外用液1% 20mL(参考:ｱｸｱﾁﾑ)	ナジフロキサシン	院外採用
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg(参考:ﾌﾘﾊﾞｽ)	ナフトピジル	院外採用
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg(参考:ﾌﾘﾊﾞｽ)	ナフトピジル	院外採用
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg(参考:ﾌﾘﾊﾞｽ)	ナフトピジル	院外採用
【般】ナラトリプタン錠2.5mg(参考:ｱﾏｰｼﾞ)	ナラトリプタン塩酸塩	院外採用
【般】ﾅﾙﾌﾗﾌｨﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg(参考:ﾚﾐｯﾁ)	ナルフラフィン塩酸塩	院外採用
【般】ニザチジン錠150mg（参考：アシノン）	ニザチジン	院外採用

【般】ニセルゴリン錠5mg:(参考:サアミオン)	ニセルゴリン	院外採用
【般】ニルバジピン錠4mg(参考：ニバジール)	ニルバジピン	院外採用
【般】ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵﾙ0.02錠(参考:ﾙﾅﾍﾞﾙULD)	ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ	院外採用
【般】ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵﾙ0.035錠(参考:ﾙﾅﾍﾞﾙLD)	ﾉｲｴｽﾃﾛﾝ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ	院外採用
【般】バゼドキシフェン錠20mg（参考：ビビアント)	バゼドキシフェン酢酸塩	院外採用
【般】バラシクロビル錠500mg(参考:ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ)	バラシクロビル塩酸塩	院外採用
【般】ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ配合OD錠(参考:ｴｯｸｽﾌｫｰｼﾞOD)	ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩	院外採用
【般】ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ・ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ12.5配合錠(参考:ｺﾃﾞｨｵEX	ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ,ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合錠	院外採用
【般】バルサルタン錠40mg(参考:ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ)	バルサルタン	院外採用
【般】バルサルタン錠80mg(参考:ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ)	バルサルタン	院外採用
【般】ハロペリドール錠0.75mg(参考:ｾﾚﾈｰｽ)	ハロペリドール	院外採用
【般】ハロペリドール錠1.5mg(参考:ｾﾚﾈｰｽ)	ハロペリドール	院外採用
【般】ハロペリドール錠1mg(参考:ｾﾚﾈｰｽ)	ハロペリドール	院外採用
【般】ハロペリドール錠3mg(参考:ｾﾚﾈｰｽ)	ハロペリドール	院外採用
【般】パンテチン散20%(参考:ﾊﾟﾝﾄｼﾝ)	パンテチン	院外採用
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL(参考:ﾋｱﾚｲﾝ)	ヒアルロン酸ナトリウム	院外採用
【般】ピオグリタゾン錠15mg(参考：ｱｸﾄｽ)	ピオグリタゾン塩酸塩	院外採用
【般】ピオグリタゾン錠30mg（参考：ｱｸﾄｽ)	ピオグリタゾン	院外採用
【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg(参考:ｶﾝﾃﾞｯｸｽ)	ビカルタミド	院外採用
【般】ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄNa経口液0.75% 10mL(参考:ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ)	ピコスルファートナトリウム	院外採用
【般】ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠2.5mg(参考：ﾒｲﾝﾃｰﾄ)	ビソプロロールフマル酸塩	院外採用
【般】ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠5mg(参考：ﾒｲﾝﾃｰﾄ)	ビソプロロールフマル酸塩	院外採用
【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg(参考:ﾘﾊﾞﾛ)	ピタバスタチンカルシウム	院外採用
【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg(参考:ﾘﾊﾞﾛ)	ピタバスタチンカルシウム	院外採用
【般】ピタバスタチンCa錠1mg(参考:ﾘﾊﾞﾛ)	ピタバスタチンカルシウム	院外採用
【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg(参考:ｱｷﾈﾄﾝ)	ビペリデン塩酸塩	院外採用
【般】ピルシカイニド塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ25mg(参考:ｻﾝﾘｽﾞﾑ)	ピルシカイニド塩酸塩	院外採用
【般】ピルシカイニド塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg(参考:ｻﾝﾘｽﾞﾑ)	ピルシカイニド塩酸塩	院外採用
【般】ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ・ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ250mg配合錠(参考ｴｸﾒｯﾄLD)	ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ・ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ250mg	院外採用
【般】ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ・ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ500mg配合錠(参考ｴｸﾒｯﾄHD)	ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ・ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ500mg	院外採用
【般】ビルダグリプチン錠５０ｍｇ（参考：ｴｸｱ)	ビルダグリプチン	院外採用
【般】ファモチジン散10%(参考:ｶﾞｽﾀｰ散)	ファモチジン	院外採用
【般】ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ・ﾌﾟｿｲﾄﾞｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ配合錠(参考:ﾃﾞｨﾚｸﾞﾗ)	ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ・ﾌﾟｿｲﾄﾞｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ	院外採用
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg(参考:ｱﾚｸﾞﾗ)	フェキソフェナジン塩酸塩	院外採用
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg(参考:ｱﾚｸﾞﾗ)	フェキソフェナジン塩酸塩	院外採用
【般】フェノフィブラート錠53.3mg(参考:ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙ)	フェノフィブラート	院外採用
【般】フェノフィブラート錠80mg(参考:ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙ)	フェノフィブラート	院外採用
【般】フェブキソスタット錠10mg(参考:ﾌｪﾌﾞﾘｸ)	フェブキソスタット	院外採用
【般】フェブキソスタット錠20mg(参考:ﾌｪﾌﾞﾘｸ)	フェブキソスタット	院外採用
【般】フェブキソスタット錠40mg(参考:ﾌｪﾌﾞﾘｸ)	フェブキソスタット	院外採用
【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15%（参考:ｽﾌﾟﾚｷｭｱ)	ブセレリン	院外採用
【般】プラスグレル錠3.75mg（参考：エフィエント)	プラスグレル	院外採用
【般】プラバスタチンNa錠10mg(参考:ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ)	プラバスタチンナトリウム	院外採用
【般】プランルカストｶﾌﾟｾﾙ112.5mg(参考:ｵﾉﾝ)	プランルカスト水和物	院外採用
【般】ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｼﾛｯﾌﾟ用100mg/g(参考:ｵﾉﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ)	プランルカスト水和物	院外採用
【般】ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ点眼液0.1% 5mL(参考:ｱｲﾌｧｶﾞﾝ)	ブリモニジン	院外採用
【般】ブリンゾラミド点眼液1% 5mL(参考:ｴｲｿﾞﾌﾟﾄ)	ブリンゾラミド	院外採用
【般】フルスルチアミン錠25mg(参考:ｱﾘﾅﾐﾝF)	フルスルチアミン	院外採用
【般】ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ点鼻液27.5ug56噴霧(参考:ｱﾗﾐｽﾄ)	フルチカゾンフランカルボン酸エ	院外採用
【般】フルニトラゼパム錠1mg(参考:ｻｲﾚｰｽ)	フルニトラゼパム	院外採用
【般】ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠25mg（参考：ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ)	フルボキサミンマレイン酸塩	院外採用
【般】ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠50mg（参考：ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ)	フルボキサミンマレイン酸塩	院外採用

【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg(参考:ﾘﾘｶ)	プレガバリン	院外採用
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg(参考:ﾘﾘｶ)	プレガバリン	院外採用
【般】フロセミド錠10mg(参考:ﾗｼｯｸｽ)	フロセミド	院外採用
【般】フロセミド錠20mg(参考:ﾗｼｯｸｽ)	フロセミド	院外採用
【般】フロセミド錠40mg(参考:ﾗｼｯｸｽ)	フロセミド	院外採用
【般】ブロナンセリン錠4mg(参考:ﾛﾅｾﾝ)	ブロナンセリン	院外採用
【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg（参考：ﾌﾟﾛﾉﾝ)	プロパフェノン塩酸塩	院外採用
【般】プロピベリン塩酸塩錠10ｍｇ（参考：ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ)	プロピベリン塩酸塩	院外採用
【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg(参考:ｺﾆｰﾙ)	ベニジピン塩酸塩	院外採用
【般】ベプリジル塩酸塩錠100mg（参考:ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ)	ベプリジル塩酸塩水和物	院外採用
【般】ベプリジル塩酸塩錠50mg（参考:ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ)	ベプリジル塩酸塩水和物	院外採用
【般】ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝﾍﾞｼﾙ酸塩口腔内崩壊錠10mg(参考:ﾀﾘｵﾝ)	ベポタスチンベシル酸塩	院外採用
【般】ベポタスチンﾍﾞｼﾙ酸塩錠10mg(参考:ﾀﾘｵﾝ)	ベポタスチンベシル酸塩	院外採用
【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg(参考:ﾜｿﾗﾝ)	ベラパミル塩酸塩	院外採用
【般】ペリンドプリルｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠2mg(参考:ｺﾊﾞｼﾙ)	ペリンドプリルエルブミン	院外採用
【般】ペリンドプリルｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠4mg(参考:ｺﾊﾞｼﾙ)	ペリンドプリルエルブミン	院外採用
【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg(参考:ﾙｰﾗﾝ)	ペロスピロン塩酸塩水和物	院外採用
【般】ベンズブロマロン錠25mg(参考:ｺﾘﾉｰﾑ)	ベンズブロマロン	院外採用
【般】ベンズブロマロン錠50mg(参考:ｺﾘﾉｰﾑ)	ベンズブロマロン	院外採用
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg(参考:ﾍﾞｲｽﾝ)	ボグリボース	院外採用
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg(参考:ﾍﾞｲｽﾝ)	ボグリボース	院外採用
【般】ポビドンヨードゲル10% 90g(参考:ｲｿｼﾞﾝｹﾞﾙ)	ポビドンヨード	院外採用
【般】ボリコナゾール錠200mg(参考:ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ)	ボリコナゾール	院外採用
【般】マニジピン塩酸塩錠10mg（参考：ｶﾙｽﾛｯﾄ)	塩酸マニジピン	院外採用
【般】ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ塩酸塩錠25mg（参考：ルジオミール)	塩酸マプロチリン	院外採用
【般】ミグリトール錠50mg(参考:ｾｲﾌﾞﾙ)	ミグリトール	院外採用
【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg(参考:ﾒﾄﾘｼﾞﾝ)	ミドドリン塩酸塩	院外採用
【般】ミノドロン酸錠50mg(参考:リカルボン)	ミノドロン酸	院外採用
【般】ミルタザピン錠15mg(参考:ﾘﾌﾚｯｸｽ)	ミルタザピン	院外採用
【般】メチルジゴキシン錠0.1mg(参考:ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ)	メチルジゴキシン	院外採用
【般】メトクロプラミド錠5mg(参考:ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ)	メトクロプラミド	院外採用
【般】ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ錠2.5mg(参考:ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ)	メドロキシプロゲステロン酢酸エ	院外採用
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg(参考:ﾒﾏﾘｰ)	メマンチン塩酸塩	院外採用
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg(参考:ﾒﾏﾘｰ)	メマンチン塩酸塩	院外採用
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg(参考:ﾒﾏﾘｰ)	メマンチン塩酸塩	院外採用
【般】ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ点眼液0.5% 5mL(参考:ﾍﾞｶﾞﾓｯｸｽ)	モキシフロキサシン塩酸塩	院外採用
【般】モサプリドｸｴﾝ酸塩散1%(参考:ｶﾞｽﾓﾁﾝ)	ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩水和物	院外採用
【般】モメタゾン点鼻液50μg112噴霧用(参考:ﾅｿﾞﾈｯｸｽ)	モメタゾンフランカルボン酸エス	院外採用
【般】ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾁｭｱﾌﾞﾙ錠5mg（参考：ｷﾌﾟﾚｽ/ｼﾝｸﾞﾚｱ)	モンテルカストナトリウム	院外採用
【般】ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ口腔内崩壊錠10mg(参考:ｼﾝｸﾞﾚｱ/ｷﾌﾟﾚｽ)	モンテルカストナトリウム	院外採用
【般】モンテルカスト細粒４mg（参考：ｼﾝｸﾞﾚｱ/ｷﾌﾟﾚｽ)	モンテルカストナトリウム	院外採用
【般】ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ点眼液0.005% 2.5mL(参考:ｷｻﾗﾀﾝ)	ラタノプロスト	院外採用
【般】ラベプラゾールNa錠10mg(参考:ﾊﾟﾘｴｯﾄ)	ラベプラゾールナトリウム	院外採用
【般】ラベプラゾールNa錠20mg(参考:ﾊﾟﾘｴｯﾄ)	ラベプラゾールナトリウム	院外採用
【般】ラメルテオン錠8mg(参考:ﾛｾﾞﾚﾑ)	ラメルテオン	院外採用
【般】ラモトリギン錠１００ｍｇ(参考:ﾗﾐｸﾀｰﾙ)	ラモトリギン	院外採用
【般】ラモトリギン錠２５ｍｇ(参考:ﾗﾐｸﾀｰﾙ)	ラモトリギン	院外採用
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg（参考：エビスタ)	塩酸ラロキシフェン	院外採用
【般】ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ口腔内崩壊錠15mg(参考：ﾀｹﾌﾟﾛﾝ)	ランソプラゾール	院外採用
【般】ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ口腔内崩壊錠30mg（参考：ﾀｹﾌﾟﾛﾝ)	ランソプラゾール	院外採用
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg(参考:ﾏｸｻﾙﾄ)	リザトリプタン安息香酸塩	院外採用
【般】リスペリドン経口液0.1%(参考：ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ)	リスペリドン	院外採用

【般】ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ口腔内崩壊錠2mg（参考：ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ）	リスペリドン	院外採用
【般】リスペリドン細粒10mg/g(参考:ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ)	リスペリドン	院外採用
【般】リセドロン酸Na錠17.5mg(参考:ｱｸﾄﾈﾙ/ﾍﾞﾈｯﾄ)	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外採用
【般】リセドロン酸Na錠2.5mg(参考:ｱｸﾄﾈﾙ/ﾍﾞﾈｯﾄ)	リセドロン酸ナトリウム	院外採用
【般】リセドロン酸Na錠75mg(参考:ｱｸﾄﾈﾙ/ﾍﾞﾈｯﾄ)	リセドロン酸ナトリウム	院外採用
【般】ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝ口腔内崩壊錠10mg(参考:ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ)	リバーロキサバン	院外採用
【般】ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝ口腔内崩壊錠15mg(参考:ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ)	リバーロキサバン	院外採用
【般】リルゾール錠50mg(参考:ﾘﾙﾃｯｸ)	リルゾール	院外採用
【般】ﾙﾘｺﾅｿﾞｰﾙクリーム1% 10g/本（参考：ﾙﾘｺﾝ）	ルリコナゾール	院外採用
【般】ルリコナゾール軟膏1% 10g/個（参考：ﾙﾘｺﾝ）	ルリコナゾール	院外採用
【般】レトロゾール錠2.5mg(参考:ﾌｪﾏｰﾗ)	レトロゾール	院外採用
【般】レパグリニド錠0.5mg (参考:ｼｭｱﾎﾟｽﾄ)	レパグリニド	院外採用
【般】レバミピド顆粒20%(100mg/包)(参考:ﾑｺｽﾀ)	レバミピド	院外採用
【般】レベチラセタム錠500mg（参考：ｲｰｹﾌﾟﾗ）	レベチラセタム	院外採用
【般】ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ用0.5%(参考:ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝDS)	レボセチリジン塩酸塩	院外採用
【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg(参考:ｻﾞｲｻﾞﾙ)	レボセチリジン塩酸塩	院外採用
【般】レボドパ100mg･カルビドパ配合錠(参考:ﾒﾈｼｯﾄ)	レボドパ・カルビドパ水和物	院外採用
【般】レボフロキサシン錠250mg(参考:ｸﾗﾋﾞｯﾄ)	レボフロキサシン水和物	院外採用
【般】レボフロキサシン錠500mg(参考:ｸﾗﾋﾞｯﾄ)	レボフロキサシン	院外採用
【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL(参考:ｸﾗﾋﾞｯﾄ)	レボフロキサシン水和物	院外採用
【般】ロキシスロマイシン錠150mg (参考:ﾙﾘｯﾄﾞ)	ロキシスロマイシン	院外採用
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg(参考:ﾛｷｿﾆﾝ)	ロキソプロフェンナトリウム	院外採用
【般】ﾛｻﾙﾀﾝ100･ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合錠(参考:ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄHD)	ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ，ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合剤	院外採用
【般】ﾛｻﾙﾀﾝ50･ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合錠(参考:ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄLD)	ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ，ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合剤	院外採用
【般】ロサルタンK錠100mg(参考:ﾆｭｰﾛﾀﾝ)	ロサルタンカリウム	院外採用
【般】ロサルタンK錠25mg(参考:ﾆｭｰﾛﾀﾝ)	ロサルタンカリウム	院外採用
【般】ロサルタンK錠50mg(参考:ﾆｭｰﾛﾀﾝ)	ロサルタンカリウム	院外採用
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg(参考:ｸﾚｽﾄｰﾙ)	ロスバスタチンカルシウム	院外採用
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg(参考:ｸﾚｽﾄｰﾙ)	ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ	院外採用
【般】ロピニロール徐放錠2mg(参考:ﾚｷｯﾌﾟ)	ロピニロール塩酸塩	院外採用
【般】ロピニロール徐放錠8mg(参考:ﾚｷｯﾌﾟ)	ロピニロール塩酸塩	院外採用
【般】ロペラミド塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg(参考：ﾛﾍﾟﾐﾝ)	塩酸ロペラミド	院外採用
【般】塩化カリウム徐放錠600mg(参考：ｽﾛｰｹｰ)	塩化カリウム	院外採用
【般】酸化マグネシウム錠330mg	酸化マグネシウム	院外採用
【般】酸化マグネシウム錠500mg	酸化マグネシウム	院外採用
【般】小児用ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ0.3%(参考:ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ)	アンブロキソール塩酸塩	院外採用
【般】酢酸亜鉛錠２５ｍｇ(参考:ﾉﾍﾞﾙｼﾞﾝ)	酢酸亜鉛水和物	院外採用
【般】水酸化Alｹﾞﾙ･水酸化Mg配合ｼﾛｯﾌﾟ用(参考:ﾏｰﾛｯｸｽ)	水酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑｹﾞﾙ,水酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	院外採用
【般】炭酸ﾗﾝﾀﾝ口腔内崩壊錠250mg(参考:ﾎｽﾚﾉｰﾙ)	炭酸ランタン水和物	院外採用
５－ＦＵ軟膏５％協和 5g	フルオロウラシル	院外採用
Ｄソルビトール液７５％	Ｄ－ソルビトール	院外採用
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸Ca錠 200mg「ﾄｰﾜ」(ｱｽﾊﾟﾗCA後発)	L-アスパラギン酸カルシウム	院内院外採用
ＭＳコンチン錠１０mg	硫酸モルヒネ	院内院外採用
ＭＳ温シップ４０ｇ×５枚／包	ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ，dl-ｶﾝﾌﾙ，ﾄｳｶﾞﾗｼｴｷｽ	院内院外採用
ＰＬ配合顆粒	サリチルアミド，アセトアミノフ	院内院外採用
S・M配合散 1.3g/包	ﾀｶｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ,ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸Mg,炭酸	院内院外採用
ＳＰトローチ0.25mg「明治」	塩化デカリニウム	院内院外採用
アーチスト錠１．２５ｍｇ	カルベジロール	院外採用
アーチスト錠２.５mg	カルベジロール	院外採用
アーテン散１０mg／ｇ	塩酸トリヘキシフェニジル	院外採用
アーテン錠２mg	塩酸トリヘキシフェニジル	院外採用
アーリーダ錠６０ｍｇ	アパルタミド	院外採用

アイセントレス錠４００ｍｇ	ラルテグラビルカリウム	院内院外採用
アイトロール錠２０mg	一硝酸イソソルビド	院内院外採用
アイピーディカプセル１００mg	トシル酸スプラタスト	院外採用
アイベータ配合点眼液 5mL/本	ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ酒石酸塩･ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩	院外採用
アイモビーグ皮下注70mgペン	エレヌマブ（遺伝子組換え）	院内院外採用
アイラミド配合懸濁性点眼液 5mL/本	ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ酒石酸塩･ﾌﾞﾘﾝｿﾞﾗﾐﾄﾞ	院外採用
アキネトン細粒1%（１０mg/g）	塩酸ピペリデン	院外採用
アクイプタ錠10mg	アトゲパント水和物	院外採用
アクイプタ錠60mg	アトゲパント水和物	院外採用
アクテムラ皮下注162mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ	トシリズマブ	院外採用
アクトシン軟膏3%　３０ｇ	ブクラデシンナトリウム	院内院外採用
アコニンサン錠	加工ブシ末	院内院外採用
アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	院外採用
アサコール錠４００ｍｇ	メサラジン	院外採用
アザルフィジンＥＮ錠５００mg	サラゾスルファピリジン	院内院外採用
アシクロビル錠200mg｢ｻﾜｲ｣(ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ後発)	アシクロビル	院内院外採用
ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ顆粒400mg/g｢ﾄｰﾜ｣(ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ顆粒後発)	アシクロビル	院内院外採用
アジスロマイシン錠250mg｢ｻﾜｲ｣(ｼﾞｽﾛﾏｯｸ後発)	アジスロマイシン	院内院外採用
アシノン錠７５mg	ニザチジン	院外採用
アジョビ皮下注225mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀ-	フレマネズマブ（遺伝子組換え）	院内院外採用
アジルサルタンOD錠20mg「DSEP」(ｱｼﾞﾙﾊﾞ後発)	アジルサルタン	院内院外採用
アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	院外採用
アスコルビン酸原末	アスコルビン酸	院外採用
アスタットクリーム１％１０ｇ	ラノコナゾール	院外採用
アスタット外用液１％１０mL	ラノコナゾール	院外採用
アスタット軟膏１％１０ｇ	ラノコナゾール	院外採用
アストミン錠１０mg	リン酸ジメモルファン	院外採用
アズノールＳＴ錠口腔用５mg	アズレン	院外採用
アズノール軟膏0.033%20g/本	ジメチルイソプロピルアズレン	院内院外採用
アスパラカリウム錠３００mg	Ｌ－アスパラギン酸カリウム	院内院外採用
アスピリン	アスピリン	院内院外採用
アスペノンカプセル２０mg	塩酸アプリンジン	院内院外採用
アスベリンシロップ５mg／mL	ヒベンズ酸チペピジン	院外採用
アスベリン散１００mg／ｇ	ヒベンズ酸チペピジン	院内院外採用
ｱｽﾞﾚﾝ含嗽用散0.4%「ﾄｰﾜ」1.5g包	アズレン	院内院外採用
アセトアミノフェン錠300mg｢ﾏﾙｲｼ｣(旧ｶﾛﾅｰﾙ)	アセトアミノフェン	院内院外採用
アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」（ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ後発）	アゼルニジピン	院内院外採用
アゾセミド錠30mg｢DSEP｣(ﾀﾞｲｱｰﾄ後発)	アゾセミド	院内院外採用
アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL	ﾌﾞﾘﾝｿﾞﾗﾐﾄﾞ・ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸	院外採用
アダプチノール錠５mg	ヘレニエン	院外採用
アダラートＣＲ錠１０mg	ニフェジピン	院外採用
アダラートＣＲ錠２０mg	ニフェジピン	院外採用
アダラートＣＲ錠４０mg	ニフェジピン	院外採用
アタラックスＰカプセル２５mg	塩酸ヒドロキシジン	院内院外採用
アタラックス-Pﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ2.5% (25mg/g)	ヒドロキシジンパモ酸塩	院内院外採用
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL｢CTNK｣	アダリムマブ(遺伝子組換え)	院内院外採用
アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL｢CTNK｣	アダリムマブ(遺伝子組換え)	院内院外採用
アデスタン腟錠300mg	硝酸イソコナゾール	院内院外採用
ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠25mg｢ｻﾜｲ｣(ﾃﾉｰﾐﾝ後発)	アテノロール	院内院外採用
アデホスコーワ腸溶錠２０mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム	院内院外採用
アデホスコーワ腸溶錠６０mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム	院外採用
アデホスコーワ顆粒10% (100mg/g)	アデノシン三リン酸二ナトリウム	院内院外採用

アテレック錠１０mg	シルニジピン	院内院外採用
アテレック錠５mg	シルニジピン	院外採用
アドエア125エアゾール120吸入用	ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙ、 ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ	院外採用
アドエア２５０ﾃﾞｨｽｶｽ60ﾌﾞﾘｽﾀｰ	ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩， ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵ	院外採用
アドエア５００ﾃﾞｨｽｶｽ60ﾌﾞﾘｽﾀｰ	ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩， ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵ	院外採用
アドエア５０エアゾール１２０吸入用	ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙ,ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ	院内院外採用
アドシルカ錠２０ｍｇ	タダラフィル	院内院外採用
アドナ散１００mg／ｇ	ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	院内院外採用
アドフィードパップ40mg 7枚/包	フルルビプロフェン	院内院外採用
アドベイト静注用キット1000	ﾙﾘｵｸﾄｺｸﾞ ｱﾙﾌｧ（遺伝子組換え）	院内院外採用
アトモキセチン錠１０ｍｇ「ﾄｰﾜ」（ｽﾄﾗﾃﾗ後発）	アトモキセチン塩酸塩	院外採用
アトモキセチン錠２５ｍｇ「ﾄｰﾜ」（ｽﾄﾗﾃﾗ後発）	アトモキセチン塩酸塩	院外採用
アトモキセチン錠４０ｍｇ「ﾄｰﾜ」（ｽﾄﾗﾃﾗ後発）	アトモキセチン塩酸塩	院外採用
アトモキセチン錠５ｍｇ「ﾄｰﾜ」（ｽﾄﾗﾃﾗ後発）	アトモキセチン塩酸塩	院外採用
アトラントクリーム１０ｇ	塩酸ネチコナゾール	院外採用
アトラント液１０mL	塩酸ネチコナゾール	院外採用
アトラント軟膏１０ｇ	塩酸ネチコナゾール	院外採用
ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝOD錠10mg「ﾄｰﾜ」(ﾘﾋﾟﾄｰﾙ10mg後発)	アトルバスタチンカルシウム	院内院外採用
ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝOD錠5mg「ﾄｰﾜ」(ﾘﾋﾟﾄｰﾙ5mg後発)	アトルバスタチンカルシウム	院外採用
アトロピン点眼液１％５mL	硫酸アトロピン	院内院外採用
アトロピン硫酸塩水和物「ﾎｴｲ」原末	硫酸アトロピン	院内院外採用
アナストロゾール錠1mg「NK」（アリミデックス後発）	アナストロゾール	院内院外採用
アナフラニール錠１０mg	塩酸クロミプラミン	院外採用
アナフラニール錠２５mg	塩酸クロミプラミン	院内院外採用
アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ	院外採用
アノーロエリプタ30吸入用	ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ/ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩	院内院外採用
アバレプト懸濁性点眼液0.3%5mL/瓶	モツギバトレプ	院外採用
アピドラ注ソロスター	インスリングルリジン	院外採用
アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩	院内院外採用
アブストラル舌下錠200μg	フェンタニルクエン酸塩	院外採用
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトニド	院内院外採用
ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ125mg「ｻﾜｲ」(ｲﾒﾝﾄﾞ後発)	アプレピタント	院内院外採用
ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ80mg「ｻﾜｲ」(ｲﾒﾝﾄﾞ後発)	アプレピタント	院内院外採用
アベロックス錠４００mg	塩酸モキシフロキサシン	院内院外採用
アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド	院内院外採用
アマリール錠１mg	グリメピリド	院外採用
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(ｱﾝｶﾛﾝ後発)	アミオダロン塩酸塩錠	院内院外採用
アミティーザカプセル１２μｇ	ルビプロストン	院外採用
アミティーザカプセル２４μｇ	ルビプロストン	院内院外採用
アミノレバンEN配合散 50g/包	肝不全用成分栄養剤	院内院外採用
ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg「ﾄｰﾜ」(ｱﾑﾛｼﾞﾝOD2.5mg後発)	アムロジピンベシル	院内院外採用
アムロジンＯＤ錠 ５mg	ペシル酸アムロジピン	院外採用
アムロジンＯＤ錠２.５mg	ペシル酸アムロジピン	院外採用
ｱﾒｼﾞﾆｳﾑﾒﾁﾙ硫酸塩錠10mg「日医工」（ﾘｽﾞﾐｯｸ後発）	アメジニウムメチル硫酸塩	院内院外採用
アメナリーフ錠200mg	アメナメビル	院内院外採用
アモキシシリンカプセル250mg「ﾄｰﾜ」（ｻﾜｼﾘﾝ後発）	アモキシシリン水和物	院内院外採用
アラセナ－Ａ軟膏３％１０ｇ	ビダラビン	院外採用
アリッサ配合錠 28錠/ｼｰﾄ	ｴｽﾃﾄﾛｰﾙ水和物・ﾄﾞﾛｽﾋﾟﾚﾉﾝ	院外採用
アリドネパッチ27．5mg	ドネペジル	院外採用
アリピプラゾール錠12mg「ｻﾜｲ」(ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ後発)	アリピプラゾール	院内院外採用
アリピプラゾール錠1mg「ｻﾜｲ」(ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ後発)	アリピプラゾール	院内院外採用
アリピプラゾール錠3mg「ｻﾜｲ」(ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ後発)	アリピプラゾール	院内院外採用

アルケラン錠２mg	メルファラン	院外採用
アルサルミン細粒９０％	スクラルファート	院内院外採用
アルダクトンＡ細粒10%(100mg/g)	スピロノラクトン	院内院外採用
アルダクトンＡ錠５０mg	スピロノラクトン	院外採用
アルタットカプセル37.5mg	ロキサチジン	院外採用
アルタットカプセル７５mg	塩酸ロキサチジンアセタート	院外採用
アルドメット錠１２５mg	メチルドパ	院外採用
アルドメット錠２５０mg	メチルドパ	院内院外採用
ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μg「ﾌｿｰ」(ｱﾙﾌｧﾛｰﾙ後発)	アルファカルシドール	院内院外採用
ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0μg「ﾌｿｰ」(ｱﾙﾌｧﾛｰﾙ後発)	アルファカルシドール	院内院外採用
アルファロール内用液0.5μg/mL	アルファカルシドール	院内院外採用
ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠0.4mg「ｻﾜｲ」(ｿﾗﾅｯｸｽ後発)	アルプラゾラム	院内院外採用
アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	院内院外採用
アレジオンLX点眼液0.1% 5mL	エピナスチン	院外採用
アレジオン眼瞼クリーム０．５％ 2g/本	エピナスチン塩酸塩	院外採用
アレビアチン錠１００mg	フェニトイン	院内院外採用
ｱﾚﾍﾞｰﾙ吸入用溶解液0.125% 100mL	チロキサポール	院内院外採用
アレンドロン酸錠35mg「日医工」(ﾌｫｻﾏｯｸ/ﾎﾞﾅﾛﾝ後発)	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院内院外採用
アローゼン顆粒	ｾﾝﾅ葉,ｵﾉﾆｽ根乾燥ｴｷｽ,ｾﾝﾅ実,ﾀﾗｸｻ	院外採用
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	院内院外採用
アロフト錠２０mg	アクロファロン	院外採用
アロプリノール錠100mg「ﾆﾌﾟﾛ」(旧ｱﾛｼﾄｰﾙ)	アロプリノール	院内院外採用
アロマシン錠２５mg	エキセメスタン	院内院外採用
アンカロン錠１００	塩酸アミオダロン	院外採用
アンテベートクリーム0.05%５ｇ	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	院外採用
アンテベートローション１０ｇ	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	院内院外採用
アンテベート軟膏0.05%５ｇ	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	院内院外採用
アンヒバ坐剤小児用１００mg	アセトアミノフェン	院内院外採用
ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙｼﾛｯﾌﾟ小児用0.3%「ﾄｰﾜ」(ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ後発)	アンブロキソール塩酸塩	院内院外採用
ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」(ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝL後発)	アンブロキソール塩酸塩	院内院外採用
アンペック坐剤１０mg	塩酸モルヒネ	院内院外採用
イーケプラドライシロップ50% 500mg/g	レベチラセタム	院内院外採用
イーシー・ドパール配合錠	塩酸ﾍﾞﾝｾﾞﾗｼﾄﾞ，ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ	院外採用
イオウカンフルローション	イオウ	院外採用
イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	院外採用
イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	院外採用
イクセロンパッチ 13.5mg	リバスチグミン	院外採用
イクセロンパッチ 18mg	リバスチグミン	院外採用
イクセロンパッチ 4.5mg	リバスチグミン	院外採用
イクセロンパッチ 9mg	リバスチグミン	院外採用
ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ600mg「ﾓﾁﾀﾞ」(ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙ後発)	イコサペント酸エチル	院内院外採用
ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ900mg「ﾓﾁﾀﾞ」(ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙ後発)	イコサペント酸エチル	院内院外採用
イスコチン錠１００mg	イソニアジド	院内院外採用
イセルティ錠100ｍｇ	リンザゴリクスコリン	院外採用
イソジンガーグル液７％３０ｍＬ	ポビドンヨード	院内院外採用
イソジンスクラブ液７．５％ 500mL	ポビドンヨード	院内院外採用
ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ内用液70%分包30mL「CEO」(ｲｿﾊﾞｲﾄﾞ後発)	イソソルビド	院外採用
イソバイドシロップ70%分包30mL	イソソルビド	院内院外採用
ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ内用液１%「VTRS」(ｲﾄﾘｿﾞｰﾙ後発)	イトラコナゾール	院内院外採用
イトリゾールカプセル５０ｍｇ	イトラコナゾール	院内院外採用
イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ （20mg/ｷｯﾄ）	オクタン酸ラニナミビル	院内院外採用
イニシンク配合錠 (ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ500mg・ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ25mg)	ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ・ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ	院外採用

ｲﾉｿﾘｯﾄﾞ配合経腸用半固形剤 300g/袋	経腸成分栄養剤半固形剤	院内院外採用
イノラス配合経腸用液 187.5mL/袋	経腸成分栄養剤	院内院外採用
イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	院内院外採用
イフェクサーSRカプセル75mg	ベンラファキシン塩酸塩	院外採用
ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ酒石酸塩錠10ｍｇ「ﾄｰﾜ」(ｾﾛｸﾗｰﾙ後発)	イフェンプロジル酒石酸塩	院内院外採用
イブプロフェン錠100mg「NIG」(ﾌﾞﾙﾌｪﾝ後発)	イブプロフェン	院内院外採用
イブランス錠１２５ｍｇ	パルボシクリブ	院外採用
イブランス錠２５ｍｇ	パルボシクリブ	院外採用
イマチニブ錠100mg「ｵｰﾊﾗ」(ｸﾞﾘﾍﾞｯｸ後発)	イマチニブメシル酸塩	院内院外採用
イミグラン点鼻液２０mg0.1mL	スマトリプタン	院外採用
イムラン錠５０mg	アザチオプリン	院内院外採用
イリボー錠 2.5μg	ラモセトロン塩酸塩	院外採用
イリボー錠５μg	ラモセトロン塩酸塩	院外採用
ｲﾙﾄﾗ配合錠LD(ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ100mg･ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ1mg)	ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ・ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ	院外採用
イルベサルタン錠100mg「DSPB」（ｱﾊﾞﾌﾟﾛ後発）	イルベサルタン	院内院外採用
インクレミンシロップ６mg／mL	ピロリン酸第二鉄	院内院外採用
ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄBS注ｶｰﾄNR「ｻﾉﾌｨ」(ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ後続)	インスリンアスパルト	院外採用
ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄBS注ｿﾛｽﾀｰNR「ｻﾉﾌｨ」(ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ後続)	インスリンアスパルト	院内院外採用
ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾗﾙｷﾞﾝBS注カート「ﾘﾘｰ」(ﾗﾝﾀｽ後続)	ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ(遺伝子組換え)	院外採用
ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾗﾙｷﾞﾝBS注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ「ﾘﾘｰ」（ﾗﾝﾀｽ後続）	ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ(遺伝子組換え)	院内院外採用
ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛBS注100単位/mL HU「ｻﾉﾌｨ」10mL	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾛ(遺伝子組換え)	院外採用
ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛBS注ｶｰﾄHU「ｻﾉﾌｨ」(ﾋｭｰﾏﾛｸﾞ後続)	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾛ(遺伝子組換え)	院外採用
インチュニブ錠１mg	グアンファシン塩酸塩	院外採用
インテバンクリーム１％２５ｇ	インドメタシン	院内院外採用
インテバン外用液1% ５０mL	インドメタシン	院外採用
インデラル錠１０mg	塩酸プロプラノロール	院内院外採用
インフリーＳカプセル２００mg	インドメタシンファルネシル	院外採用
ウインタミン細粒１００mg／ｇ	塩酸クロルプロマジン	院外採用
ウテメリン錠５mg	塩酸リトドリン	院内院外採用
ウプトラビ錠0.2mg	セレキシパグ	院外採用
ウプトラビ錠0.4mg	セレキシパグ	院外採用
ウプトラビ錠0.8mg	セレキシパグ	院外採用
ウブレチド錠５mg	臭化ジスチグミン	院内院外採用
ウラリット-U配合散１ｇ／包	クエン酸カリウム，クエン酸ナト	院外採用
ウラリット配合錠	クエン酸カリウム，クエン酸ナト	院外採用
ウルグートカプセル２００mg	塩酸ﾍﾞﾈｷｻｰﾄ，β-ｼｸﾛﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ包接	院外採用
ウルソデオキシコール酸錠100mg「ﾄｰﾜ」(ｳﾙｿ後発)	ウルソデオキシコール酸	院内院外採用
ウルソ錠１００mg	ウルソデオキシコール酸	院外採用
ウルソ顆粒５０mg／ｇ	ウルソデオキシコール酸	院内院外採用
ウルティブロ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ(7ｶﾌﾟｾﾙ/ｼｰﾄ)	ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩/ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ	院内院外採用
ウレパールクリーム10% ２０ｇ	尿素	院外採用
エイベリス点眼液0.002%2.5mL	オミデネパグ　イソプロピル	院外採用
エースコール錠２mg	塩酸テモカプリル	院外採用
エキザルベ５ｇ	混合死菌浮遊液，ヒドロコルチゾ	院外採用
エクストラフローHME(7272)(20個/箱)	人工鼻	院外採用
エクストラフローHME(7291)(30個/箱)	人工鼻	院外採用
エクストラベース(7265)(20枚入)	整形外科用テープ	院外採用
エクストラモイストHME(7273)(20個/箱)	人工鼻	院外採用
エクストラモイストHME(7290)(30個/箱)	人工鼻	院外採用
エクセグラン散２００mg／ｇ	ゾニサミド	院内院外採用
エクセグラン錠１００mg	ゾニサミド	院内院外採用
エクラープラスター20μg／cm2	デプロドンプロピオン酸エステル	院内院外採用

エクラーローション１０ｇ	プロピオン酸デプロドン	院外採用
エコリシン眼軟膏 3.5ｇ	ﾗｸﾄﾋﾞｵﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ，ｺﾘｽﾁﾝﾒﾀﾝｽﾙﾎ	院内院外採用
エスクレ坐剤２５０mg	抱水クロラール	院内院外採用
エスクレ坐剤５００mg	抱水クロラール	院内院外採用
エスシタロプラムOD錠10mg｢DSEP｣（ﾚｸｻﾌﾞﾛ後発）	エスシタロプラムシュウ酸塩	院内院外採用
エスゾピクロン錠1mg｢ｻﾜｲ｣(ﾙﾈｽﾀ後発)	エスゾピクロン	院内院外採用
エストラーナテープ０．０９mg	エストラジオール	院外採用
エストラーナテープ０.１８mg	エストラジオール	院外採用
エストラーナテープ０.３６mg	エストラジオール	院外採用
エストラーナテープ０.７２mg	エストラジオール	院外採用
エストリール錠１mg	エストリオール	院外採用
エストリール腟錠0.５mg	エストリオール	院内院外採用
エスワンタイホウ配合OD錠T20(ﾃｨｰｴｽﾜﾝ後発)	ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	院内院外採用
エスワンタイホウ配合OD錠T25(ﾃｨｰｴｽﾜﾝ後発)	ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	院内院外採用
エゼチミブ錠10mg「DSEP」（ｾﾞﾁｰｱ後発）	エゼチミブ	院内院外採用
エソメプラゾールｶﾌﾟｾﾙ20mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣(ﾈｷｼｳﾑ後発)	エソメプラゾール	院内院外採用
ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄBS皮下注50mgﾍﾟﾝ 1.0mL｢日医工｣	エタネルセプト（遺伝子組換え）	院外採用
エチゾラム錠0.5mg「SW」（ﾃﾞﾊﾟｽ錠0.5mg後発）	エチゾラム	院内院外採用
エチゾラム錠1mg「SW」（ﾃﾞﾊﾟｽ錠1mg後発）	エチゾラム	院内院外採用
エディロール錠0.75μｇ	エルデカルシトール	院外採用
エトドラク錠200mg｢SW｣(ﾊｲﾍﾟﾝ後発)	エトドラク	院内院外採用
エナジア吸入用ｶﾌﾟｾﾙ高用量（7ｶﾌﾟｾﾙ/ｼｰﾄ）	ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ酢酸塩/ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ/ﾓﾒﾀ	院外採用
エナジア吸入用ｶﾌﾟｾﾙ中用量（7ｶﾌﾟｾﾙ/ｼｰﾄ）	ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ酢酸塩/ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ/ﾓﾒﾀ	院外採用
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠2.5mg｢ﾄｰﾜ｣(ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠2.5後発)	エナラプリルマレイン酸塩	院内院外採用
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠5mg｢ﾄｰﾜ｣(ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠5後発)	エナラプリルマレイン酸塩	院内院外採用
エナロイ錠2mg	エナロデュスタット	院外採用
エネーボ配合経腸用液	経腸栄養剤（半消化態）	院内院外採用
エパデールＥＭカプセル２ｇ/包	イコサペント酸エチル	院外採用
エパデールカプセル３００mg	イコサペント酸エチル	院外採用
エバミール錠１mg	ロルメタゼパム	院内院外採用
ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg｢NP｣(ｷﾈﾀﾞｯｸ後発)	エパルレスタット	院外採用
エピビル錠１５０mg	ラミブジン	院内院外採用
エビプロスタット配合錠ＤＢ	ｵｵｳﾒｶﾞｻｿｳ、ﾊｺﾔﾅｷﾞ、ｾｲﾖｳｵｷﾅｸﾞｻ等	院外採用
エピペン注射液 0.15mg	エピネフリン	院外採用
エピペン注射液 0.3mg	エピネフリン	院外採用
ｴﾋﾟﾚｵﾌﾟﾁﾏﾙ散50%（500mg/g）	エトサクシミド	院外採用
エフィエントOD錠２０ｍｇ	プラスグレル塩酸塩	院内院外採用
ｴﾌｨﾅｺﾅｿﾞｰﾙ爪外用液10%「科研」 3.56g（ｸﾚﾅﾌｨﾝ後発）	エフィナコナゾール	院内院外採用
エブトール錠２５０mg	塩酸エタンブトール	院内院外採用
エブランチルカプセル１５mg	ウラピジル	院内院外採用
エブランチルカプセル３０mg	ウラピジル	院外採用
エプレレノン錠25mg｢杏林｣(セララ後発)	エプレレノン	院内院外採用
エペリゾン塩酸塩錠50mg「ﾄｰﾜ」（ﾐｵﾅｰﾙ後発）	エペリゾン塩酸塩	院内院外採用
エベレンゾ錠20mg	ロキサデュスタット	院内院外採用
エベレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット	院外採用
エボザックカプセル３０mg	塩酸セビメリン	院外採用
エムガルティ皮下注120mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）	院内院外採用
エリキュース錠2.5mg	アピキサバン	院内院外採用
エリキュース錠5mg	アピキサバン	院内院外採用
エルカルチンFF錠１００ｍｇ	レボカルニチン	院外採用
エルカルチンFF錠２５０ｍｇ	レボカルニチン	院外採用
エレンタール配合内用剤 80g/包	経腸栄養剤（消化態）	院内院外採用

エンクラッセ62.5μｇエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物	院外採用
エンシュア・Ｈ２５０mL	経腸栄養剤（半消化態）	院内院外採用
エンタカポン錠100mg「JG」(ｺﾑﾀﾝ後発)	エンタカポン	院内院外採用
エンテカビル錠0.5mg「ﾄｰﾜ」（ﾊﾞﾗｸﾙｰﾄﾞ後発）	エンテカビル水和物	院内院外採用
エンドキサン錠５０mg	シクロホスファミド	院内院外採用
エンレスト錠 50mg	ｻｸﾋﾞﾄﾘﾙﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物	院内院外採用
エンレスト錠100mg	ｻｸﾋﾞﾄﾘﾙﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物	院内院外採用
エンレスト錠200mg	ｻｸﾋﾞﾄﾘﾙﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物	院内院外採用
オイラックスクリーム10% １０ｇ	クロタミトン	院内院外採用
オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入	ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外採用
オーグメンチン配合錠250ＲＳ	ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘｳﾑ，ｱﾓｷｼｼﾘﾝ	院内院外採用
ｵｷｻﾛｰﾙﾛｰｼｮﾝ25μg/g10g	マキサカルシトール	院外採用
オキサロール軟膏25μg/g 10g	マキサカルシトール	院内院外採用
オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外採用
オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院外採用
オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外採用
オキシドール３％５００mL	オキシドール	院内院外採用
オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩	院外採用
オキノーム散２.５ｍｇ（0.5g包）	オキシコドン塩酸塩	院内院外採用
オキノーム散２０ｍｇ	オキシコドン塩酸塩水和物	院外採用
オキノーム散５ｍｇ（1g包）	オキシコドン塩酸塩	院内院外採用
ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ皮下注100μｇ「ｻﾝﾄﾞ」1mL(ｻﾝﾄﾞｽﾀﾁﾝ後発)	酢酸オクトレオチド	院内院外採用
オスタバロ皮下注ｶｰﾄﾘｯｼﾞ1.5mg	アバロパラチド酢酸塩	院内院外採用
オスバン消毒液10%500mL	塩化ベンザルコニウム	院内院外採用
オスポロット錠２００mg	スルチアム	院外採用
オゼックス錠１５０mg	トシル酸トスフロキサシン	院外採用
オゼンピック皮下注２ｍｇ	セマグルチド（遺伝子組換え）	院内院外採用
オダイン錠１２５mg	フルタミド	院外採用
オテズラ錠１０ｍｇ	アプレミラスト	院外採用
オテズラ錠２０ｍｇ	アプレミラスト	院外採用
オテズラ錠３０ｍｇ	アプレミラスト	院外採用
オパルモン錠５ug	ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄ，α-ｼｸﾛﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ包接化合	院外採用
オビドレル皮下注シリンジ２５０μｇ	コリオゴナドトロピン　アルファ	院外採用
オフェブカプセル100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	院内院外採用
オフェブカプセル150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	院内院外採用
オプスミット錠１０ｍｇ	マシテンタン	院内院外採用
オプソ内服液１０mg/５mL包	塩酸モルヒネ	院外採用
オプソ内服液５mg/２.５mL包	塩酸モルヒネ	院内院外採用
オプティダーム円形(7255)(20枚入)	整形外科用テープ	院外採用
オプティダーム楕円形(7256)(20枚入)	整形外科用テープ	院外採用
オプティダーム楕円形(7256JP)(15枚入)	整形外科用テープ	院外採用
ｵﾒｶﾞ-3脂肪酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ2g「MJT」(ﾛﾄﾘｶﾞ後発)	オメガ-3脂肪酸エチルカプセル	院内院外採用
オラペネム小児用細粒10%	テビペネム	院内院外採用
オランザピンOD錠5mg「ｱﾒﾙ」(ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ後発)	オランザピン	院内院外採用
オランザピン細粒1%「日新」10mg/g (ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ後発)	オランザピン	院内院外採用
オリブ油	オリブ油	院内院外採用
オルケディア錠1mg	エボカルセト	院内院外採用
オルケディア錠２ｍｇ	エボカルセト	院外採用
オルケディア錠4ｍｇ	エボカルセト	院外採用
オルベスコ100μgインヘラー56吸入用	シクレソニド	院外採用
ｵﾙﾍﾞｽｺ200μgｲﾝﾍﾗｰ56吸入用	シクレソニド	院外採用
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」（ｵﾙﾒﾃｯｸ後発）	オルメサルタン　メドキソミル	院内院外採用

オルメテックOD錠5mg	オルメサルタンメドキソミル	院外採用
オレンシア皮下注125mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ	アバタセプト	院内院外採用
ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩OD錠5mg「明治」(ｱﾚﾛｯｸOD後発)	オロパタジン塩酸塩	院内院外採用
オロパタジン点眼液0.1%「ｻﾝﾄﾞ」5mL(ﾊﾞﾀﾉｰﾙ後発)	オロパタジン塩酸塩	院内院外採用
オングリザ錠5mg	サキサグリプチン水和物	院外採用
オンジェンティス錠２５ｍｇ	オピカポン	院外採用
オンブレス吸入用ｶﾌﾟｾﾙ150μg(7ｶﾌﾟｾﾙ/ｼｰﾄ)	インダカテロール	院内院外採用
カイトリル錠２mg	塩酸グラニセトロン	院内院外採用
ガスコン錠４０mg	ジメチルポリシロキサン	院内院外採用
ガスターＤ錠２０mg	ファモチジン	院外採用
ガスター錠２０mg	ファモチジン	院外採用
ガスモチン錠５mg	クエン酸モサプリド	院外採用
カタリンＫ点眼用0.005% １５mL	ピレノキシン	院外採用
ガチフロ点眼液0.3% 5mL	ガチフロキサシン	院外採用
カデックス軟膏0.9%４０ｇ	ヨウ素	院内院外採用
カトレップパップ70mg 5枚入/包	インドメタシン	院外採用
カナグルＯＤ錠100mg	カナグリフロジン水和物	院内院外採用
カナマイシンカプセル２５０mg「明治」	硫酸カナマイシン	院外採用
カナリア配合OD錠(ｶﾅｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ100mg･ﾃﾈﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ20mg)	ﾃﾈﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ・ｶﾅｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ	院外採用
ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ	ガニレリクス酢酸塩	院外採用
カバサール錠0.２５mg	カベルゴリン	院外採用
カバサール錠１mg	カベルゴリン	院内院外採用
カフェイン水和物	カフェイン水和物	院外採用
カプトリル錠12.5mg	カプトプリル	院内院外採用
カペシタビン錠300mg「ヤクルト」(ｾﾞﾛｰﾀﾞ後発)	カペシタビン	院内院外採用
カボメティクス錠20mg	カボザンチニブリンゴ酸塩	院外採用
カボメティクス錠60mg	カボザンチニブリンゴ酸塩	院外採用
カマ（酸化マグネシウム散）	酸化マグネシウム	院内院外採用
ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩錠100mg「日医工」(ﾌｵｲﾊﾞﾝ後発)	カモスタットメシル酸塩	院内院外採用
カリメート経口液20％25g/包	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ	院内院外採用
カリメート散５ｇ包	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ	院内院外採用
カルタンOD錠 500mg	沈降炭酸カルシウム	院外採用
カルナクリン錠25	ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ	院内院外採用
ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸Na錠30mg「ﾄｰﾜ」(ｱﾄﾞﾅ後発)	ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物	院内院外採用
カルバマゼピン錠200mg「ｱﾒﾙ」(ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ後発)	カルバマゼピン	院内院外採用
カルブロック錠 8mg	アゼルニジピン	院外採用
カルベジロール錠1.25mg「DSEP」(ｱｰﾁｽﾄ後発)	カルベジロール	院内院外採用
カルベジロール錠10mg「DSEP」(ｱｰﾁｽﾄ後発)	カルベジロール	院内院外採用
カルベジロール錠2.5mg「DSEP」(ｱｰﾁｽﾄ後発)	カルベジロール	院内院外採用
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ50%「NIG」(ﾑｺﾀﾞｲﾝ後発)	カルボシステイン	院内院外採用
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠250mg「ﾄｰﾜ」(ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠250mg後発)	カルボシステイン	院内院外採用
カレトラ配合錠	ロピナビル，リトナビル	院内院外採用
カロナールシロップ２０mg／mL	アセトアミノフェン	院内院外採用
カロナール原末	アセトアミノフェン	院内院外採用
ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠8mg「あすか」(ﾌﾟﾛﾌﾟﾚｽ後発)	カンデサルタン　シレキセチル	院内院外採用
キシロカインゼリー２％　３０mL	塩酸リドカイン	院内院外採用
キックリン顆粒86.2%862mg/g	ビキサロマー	院内院外採用
ギャバロン錠５mg	バクロフェン	院内院外採用
キャブピリン配合錠（ｱｽﾋﾟﾘﾝ100mg･ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ10mg)	ｱｽﾋﾟﾘﾝ/ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝﾌﾏﾙ酸塩	院外採用
キャベジンＵコーワ錠２５mg	メチルメチオニンスルホニウムク	院外採用
キュバール１００エアゾール	プロピオン酸ベクロメタゾン	院内院外採用
クービビック錠２５ｍｇ	ダリドレキサント	院内院外採用

クービビック錠５０ｍｇ	ダリドレキサント	院外採用
グーフィス錠５ｍｇ	エロビキシバット水和物	院内院外採用
クエチアピン細粒50%｢ﾀｶﾀ｣(ｾﾛｸｴﾙ後発)	クエチアピンフマル酸塩	院内院外採用
クエチアピン錠100mg「明治」(セロクエル後発)	クエチアピンフマル酸塩	院内院外採用
クエチアピン錠25mg「明治」(セロクエル後発)	クエチアピンフマル酸塩	院内院外採用
クエンメット配合散 １ｇ/包 (ウラリット後発)	ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ・ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物	院内院外採用
クエン酸第一鉄Na錠50mg｢ｻﾜｲ｣(ﾌｪﾛﾐｱ錠後発)	クエン酸第一鉄ナトリウム	院内院外採用
グラアルファ配合点眼液 5mL	ﾘﾊﾞｽｼﾞﾙ塩酸塩 ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ酒石酸塩	院外採用
グラクティブ錠５０ｍｇ	シタグリプチンリン酸	院外採用
グラケーカプセル１５mg	メナテトレノン	院内院外採用
クラシエ人参養栄湯エキス細粒3.75g/包	人参養栄湯エキス	院外採用
ｸﾗｼｴ半夏白朮天麻湯ｴｷｽ細粒2.5g包	半夏白朮天麻湯エキス	院外採用
グラセプターカプセル０.５mg	タクロリムス徐放カプセル	院内院外採用
グラセプターカプセル１mg	タクロリムス徐放カプセル	院内院外採用
グラナテック点眼液0.4% 5mL	リパスジル塩酸塩水和物	院内院外採用
ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ内服2mgｾﾞﾘｰ「ｹﾐﾌｧ」(ｶｲﾄﾘﾙ後発)	グラニセトロン塩酸塩	院内院外採用
グラマリール錠２５mg	塩酸チアプリド	院内院外採用
ｸﾗﾘｽﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ10%小児用 100mg/g	クラリスロマイシン	院外採用
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝDS小児用10%「ﾀｶﾀ」(ｸﾗﾘｼｯﾄﾞDS後発)	クラリスロマイシン	院内院外採用
クラリスロマイシン錠200mg「ﾀｶﾀ」(ｸﾗﾘｽ後発)	クラリスロマイシン	院内院外採用
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠小児用50mg「ﾀｶﾀ」(ｸﾗﾘｽ後発)	クラリスロマイシン	院内院外採用
クラリス錠２００mg	クラリスロマイシン	院外採用
クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ	ロラタジン	院外採用
グランダキシン錠５０mg	トフィソパム	院内院外採用
グリセリン「ケンエー」	グリセリン	院外採用
ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸液50%「ｹﾝｴｰ」120mL (旧ｹﾝｴｰG)	グリセリン	院内院外採用
ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸液50%「ｹﾝｴｰ」30mL (旧ｹﾝｴｰG)	グリセリン	院内院外採用
ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸液50%「ｹﾝｴｰ」60mL (旧ｹﾝｴｰG)	グリセリン	院内院外採用
グリチロン配合錠	ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ, ﾒﾁｵﾆﾝ, ｸﾞﾘｼﾝ	院内院外採用
グリミクロンHA錠 20mg	グリクラジド	院外採用
グリミクロン錠４０mg	グリクラジド	院内院外採用
グリメピリド錠１mg｢杏林｣(ｱﾏﾘｰﾙ後発)	グリメピリド	院内院外採用
グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン	院内院外採用
グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ	グルコン酸カリウム	院内院外採用
グルコンサンＫ錠５ｍＥｑ	グルコン酸カリウム	院外採用
グルファストOD錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	院外採用
グルベス配合OD錠(ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞ10mg･ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ0.2mg)	ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和物･ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ	院外採用
グレースビット錠５０mg	シタフロキサシン	院内院外採用
クレナフィン爪外用液10% 3.56g(4mL)/本	エフィナコナゾール	院外採用
クレナフィン爪外用液10% 7.12g(8mL)/本	エフィナコナゾール	院外採用
クレメジン細粒分包2g	炭素	院外採用
クレメジン速崩錠500mg (4錠/包)	球形吸着炭	院内院外採用
グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン	院外採用
グロウジェクト皮下注6mg	ソマトロピン	院外採用
クロチアゼパム錠5mg｢サワイ｣(リーゼ後発)	クロチアゼパム	院内院外採用
クロトリマゾール腟錠100ｍｇ「F」 (エンペシド後発)	クロトリマゾール	院内院外採用
ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠25mg｢SANIK｣(ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ後発)	クロピドグレル硫酸塩	院内院外採用
ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg｢SANIK｣(ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ後発)	クロピドグレル硫酸塩	院内院外採用
ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸軟膏0.05%｢MYK｣ 5g (ﾃﾞﾙﾓﾍﾞｰﾄ後発)	クロベタゾールプロピオン酸エス	院内院外採用
ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾛｰｼｮﾝ0.05%｢MYK｣ 10g (ﾃﾞﾙﾓﾍﾞｰﾄ後発)	プロピオン酸クロベタゾール	院内院外採用
クロマイ腟錠１００mg	クロラムフェニコール	院内院外採用
クロミッド錠５０mg	クエン酸クロミフェン	院外採用

ケアラム錠２５ｍｇ	イグラチモド	院外採用
ケイツーカプセル５mg	メナテトレノン	院内院外採用
ケイツーシロップ0.2%1mL包	メナテトレノン	院内院外採用
ゲーベンクリーム１％１００ｇ	スルファジアジン銀	院内院外採用
ゲーベンクリーム１％５００ｇ	スルファジアジン銀	院内院外採用
ケタスカプセル１０mg	イブジラスト	院外採用
ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ40mg「ﾃｲｺｸ」 7枚/袋(ﾓｰﾗｽ後発)	ケトプロフェン	院内院外採用
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」(ｲﾚｯｻ後発)	ゲフィチニブ	院外採用
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ（遺伝子組換え）	院外採用
ケフレックスカプセル２５０ｍｇ	セファレキシン	院外採用
ケラチナミンｺｰﾜクリーム20%25g	尿素	院内院外採用
ケレンディア錠10mg	フィネレノン	院内院外採用
ケレンディア錠20mg	フィネレノン	院内院外採用
ゲンタシンクリーム０．１％１０ｇ	硫酸ゲンタマイシン	院外採用
ゲンタシン軟膏０．１％１０ｇ	硫酸ゲンタマイシン	院外採用
ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩点眼液0.3%｢ﾆｯﾄｰ｣5mL	ゲンタマイシン硫酸塩	院内院外採用
ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩軟膏0.1% 10g (ｹﾞﾝﾀｼﾝ軟膏後発)	ゲンタマイシン硫酸塩	院内院外採用
コートリル錠１０mg	ヒドロコルチゾン	院内院外採用
コスパノン錠４０mg	フロプロピオン	院内院外採用
コスパノン錠８０mg	フロプロピオン	院外採用
コセンティクス皮下注150mgペン	セクキヌマブ	院外採用
コセンティクス皮下注300mgペン	セクキヌマブ	院外採用
コデインリン酸塩散10%	リン酸コデイン	院内院外採用
コデインリン酸塩錠20mg	コデインリン酸塩	院内院外採用
ゴナールエフ皮下注ペン150	フォリトロピン アルファ	院内院外採用
ゴナールエフ皮下注ペン３００	フォリトロピン アルファ	院内院外採用
ゴナールエフ皮下注ペン４５０	フォリトロピンアルファ	院外採用
ゴナールエフ皮下注ペン９００	フォリトロピンアルファ	院外採用
コニール錠 2mg	ベニジピン	院外採用
コムクロシャンプー0.05％	ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ	院外採用
コムレクス耳科用液１．５％5mL/本	レボフロキサシン水和物	院内院外採用
コメリアンコーワ錠５０mg	塩酸ジラゼプ	院外採用
コララン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩	院内院外採用
コララン錠5mg	イバブラジン塩酸塩	院外採用
コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」	コルヒチン	院内院外採用
コレクチム軟膏0.25% 5g	デルゴシチニブ	院外採用
コレクチム軟膏0.5% 5g	デルゴシチニブ	院内院外採用
コレバイン錠５００mg	コレスチミド	院内院外採用
コンサータ錠１８mg	塩酸メチルフェニデート	院外採用
コンサータ錠２７mg	塩酸メチルフェニデート	院外採用
コンスタン錠0.4 mg	アルプラゾラム	院外採用
コントミン糖衣錠12.5mg	塩酸クロルプロマジン	院外採用
コントミン糖衣錠２５mg	塩酸クロルプロマジン	院内院外採用
コンプラビン配合錠 (ｱｽﾋﾟﾘﾝ100mg･ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ75mg)	クロピドグレル/アスピリン	院外採用
ザーネ軟膏０.５％	ビタミンＡ	院内院外採用
ザイザルシロップ0.05%（0.5mg/mL）	レボセチリジン塩酸塩	院外採用
ザイティガ錠２５０ｍｇ	アビラテロン酢酸エステル	院外採用
ザイティガ錠５００ｍｇ	アビラテロン酢酸エステル	院外採用
サイトテック錠１００ug	ミソプロストール	院外採用
ザジテン点眼液0.05% 5 mL	フマル酸ケトチフェン	院内院外採用
ザジテン点鼻液0.05%8mL	フマル酸ケトチフェン	院外採用
ザズベイカプセル30ｍｇ	ズラノロン	院外採用

ザファテック錠１００mg	トレラグリプチンコハク酸塩	院外採用
ザファテック錠50mg	トレラグリプチンコハク酸塩	院外採用
サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン	院外採用
サムスカ顆粒1%	トルバプタン	院内院外採用
ｻﾑﾁﾚｰﾙ内用懸濁液15%750mg/包	アトバコン	院内院外採用
ザラカム配合点眼液2.5mL/瓶	ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ、ﾏﾚｲﾝ酸ﾁﾓﾛｰﾙ	院内院外採用
サラジェン錠５mg	ピロカルピン塩酸塩	院内院外採用
サラジェン顆粒0.5%（5mg/包）	ピロカルピン塩酸塩	院外採用
サラゾピリン錠５００mg	サラゾスルファピリジン	院外採用
サリチル酸ワセリン軟膏５％	サリチル酸	院内院外採用
サリベートエアゾール50g	人工唾液	院内院外採用
サルタノールインヘラー１3.5mL	硫酸サルブタモール	院外採用
ザルティア錠5mg	タダラフィル	院内院外採用
ｻﾙﾎﾞｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠100mg「ｵｰﾊﾗ」（ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ後発）	サルポグレラート塩酸塩	院内院外採用
サワシリンカプセル２５０mg	アモキシシリン	院外採用
サワシリン細粒10%（100mg/g）	アモキシシリン	院外採用
サンコバ点眼液0.02% 5mL	シアノコバラミン	院外採用
サンピロ点眼液１％5mL	塩酸ピロカルピン	院内院外採用
サンピロ点眼液２％5mL	塩酸ピロカルピン	院内院外採用
サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%5mL/本(ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ後発)	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ	院内院外採用
ジアゼパム錠2mg「アメル」（セルシン後発）	ジアゼパム	院内院外採用
ジアゼパム錠5「トーワ」（ホリゾン後発）	ジアゼパム	院内院外採用
シアリス錠10mg	タダラフィル	院外採用
ジェニナック錠２００mg	メシル酸ガレノキサシン	院内院外採用
ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ	ソマトロピン	院外採用
ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg	ソマトロピン	院外採用
ジェミーナ配合錠	ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ	院外採用
ｼﾞｵｸﾁﾙｿﾞｳﾑ ｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ耳科用液5%「CEO」10mL	ｼﾞｵｸﾁﾙｿﾞｳﾑ ｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ	院内院外採用
ジクアスＬＸ点眼液3% 5mL	ジクアホソルナトリウム	院外採用
ジクアス点眼液3% 5mL	ジクアホソルナトリウム	院内院外採用
ジクトルテープ７５ｍｇ	ジクロフェナクナトリウム	院内院外採用
シグマート錠５mg	ニコランジル	院外採用
シクレスト舌下錠5mg	アセナピンマレイン酸塩	院内院外採用
シクロスポリンカプセル10mg｢ｻﾝﾄﾞ｣(ﾈｵｰﾗﾙ後発)	シクロスポリン	院内院外採用
シクロスポリンカプセル25mg｢ｻﾝﾄﾞ｣(ﾈｵｰﾗﾙ後発)	シクロスポリン	院内院外採用
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNaｹﾞﾙ1%「ﾗｸｰﾙ」50g (ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｹﾞﾙ後発)	ジクロフェナクナトリウム	院内院外採用
ジクロフェナクNa錠25mg「ﾄｰﾜ」(ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ後発)	ジクロフェナクナトリウム	院内院外採用
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐剤12.5mg「JG」（ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾞ後発）	ジクロフェナクナトリウム	院内院外採用
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐剤25mg「JG」（ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾞ後発）	ジクロフェナクナトリウム	院内院外採用
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐剤50mg「JG」（ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾞ後発）	ジクロフェナクナトリウム	院内院外採用
ジゴシン散１mg／ｇ	ジゴキシン	院外採用
ジスロマックカプセル１００mg	アジスロマイシン	院外採用
ジスロマック細粒小児用10%（100mg/ｇ）	アジスロマイシン	院内院外採用
シナール配合錠	ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸，ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ	院内院外採用
シナール配合顆粒 １ｇ／包	ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸，ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ	院内院外採用
ジピリダモール散12.5%「JG」	ジピリダモール	院外採用
ジピリダモール錠25mg「トーワ」(ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ後発)	ジピリダモール	院内院外採用
ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg「ﾄｰﾜ」（ｾﾌｧﾄﾞｰﾙ後発）	ジフェニドール	院内院外採用
ジフルカンカプセル１００mg	フルコナゾール	院外採用
ジフルカンカプセル５０mg	フルコナゾール	院外採用
ｼﾞﾌﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾅｰﾄｸﾘｰﾑ0.05％「ｲﾜｷ」（ﾏｲｻﾞｰ後発） ５g/本	ジフルプレドナート	院内院外採用
ｼﾞﾌﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾅｰﾄ軟膏0.05%｢ｲﾜｷ｣(ﾏｲｻﾞｰ後発) 10g	ジフルプレドナート	院内院外採用

シプロキサン錠２００mg	塩酸シプロフロキサシン	院内院外採用
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「ｻﾜｲ」（ｼﾍﾞﾉｰﾙ後発）	シベンゾリンコハク酸塩	院内院外採用
シムジア皮下注200mgオートクリックス	ｾﾙﾄﾘｽﾞﾏﾌﾞ ﾍﾟｺﾞﾙ(遺伝子組換え)	院外採用
ｼﾑﾋﾞｺｰﾄﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ60吸入	ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ,ﾌﾏﾙ酸ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ	院内院外採用
ｼﾞﾒﾁｺﾝ内用液2%「ﾎﾘｲ」 300mL（ｶﾞｽｺﾝ後発）	ジメチコン	院内院外採用
ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	院内院外採用
ジャディアンス錠25mg	エンパグリフロジン	院外採用
ジャヌビア錠25mg	シタグリプチンリン酸	院外採用
ジャヌビア錠50mg	シタグリプチンリン酸	院内院外採用
ジラゼプ塩酸塩錠50mg「ｻﾜｲ」(ｺﾒﾘｱﾝ後発)	ジラゼプ塩酸塩水和物	院内院外採用
ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙOD錠100mg「ｻﾜｲ」(ﾌﾟﾚﾀｰﾙ後発)	シロスタゾール	院内院外採用
シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「DSEP」(ﾕﾘｰﾌ後発)	シロドシン	院内院外採用
ジンタス錠50ｍｇ	ヒスチジン亜鉛水和物	院内院外採用
シンバスタチン錠5mg「VTRS」(ﾘﾎﾞﾊﾞｽ後発)	シンバスタチン	院外採用
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	院外採用
シンメトレル錠５０mg	塩酸アマンタジン	院内院外採用
スイニー錠 100ｍｇ	アナグリプチン	院外採用
スインプロイク錠０．２ｍｇ	ナルデメジントシル酸塩	院内院外採用
スーグラ錠25ｍｇ	イプラグリフロジン　L-プロリン	院外採用
スーグラ錠50mg	イプラグリフロジン　L-プロリン	院内院外採用
スージャヌ配合錠(ｲﾌﾟﾗｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ50mg･ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ50mg)	ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ・ｲﾌﾟﾗｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ	院外採用
スーテントカプセル 12.5mg	リンゴ酸スニチニブ	院外採用
スタデルムクリーム5%１０ｇ	イブプロフェンピコノール	院外採用
スタビリベース(7289)(15枚入)	整形外科用テープ	院外採用
スタビリベースオプティダーム(7318)(15枚入)	整形外科用テープ	院外採用
スタレボ配合錠L100	ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ/ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ/ｴﾝﾀｶﾎﾞﾝ	院外採用
スタレボ配合錠L50	ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ/ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ/ｴﾝﾀｶﾎﾞﾝ	院外採用
スチバーガ錠 40mg	レゴラフェニブ	院外採用
ステリクロンＲ液0.５％	グルコン酸クロルヘキシジン	院内院外採用
ステリクロンW液0.０５％	グルコン酸クロルヘキシジン	院内院外採用
ストミンＡ配合錠	ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ・塩酸ﾊﾟﾊﾟﾍﾞﾘﾝ	院外採用
ストロカイン錠５mg	オキセサゼイン	院外採用
スピール膏M	サリチル酸	院外採用
スピオルトレスピマット60吸入	ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ臭化物・ｵﾛﾀﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩	院内院外採用
スピジア点鼻液10ｍｇ	ジアゼパム	院外採用
スピジア点鼻液５ｍｇ	ジアゼパム	院外採用
スピジア点鼻液７．５ｍｇ	ジアゼパム	院外採用
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	臭化チオトロピウム水和物	院内院外採用
スピロノラクトン錠２５mg「NP」（ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA後発）	スピロノラクトン	院内院外採用
スピロペント錠１０ug	塩酸クレンブテロール	院外採用
ズファジラン錠１０mg	塩酸イソクスプリン	院外採用
スペリア錠200mg（クリアナール同成分）	フドステイン	院内院外採用
スルピリド錠50mg「サワイ」（ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ後発）	スルピリド	院内院外採用
セイブル錠 25mg	ミグリトール	院外採用
ゼジューラ錠100mg	ニラパリブトシル酸塩水和物	院外採用
ゼスラン錠３mg	メキタジン	院外採用
セタネオ点眼液0.002% 2.5mL/本	セペタプロスト	院外採用
セトロタイド注射用0.25mg（溶解液付）	セトロレリクス酢酸塩	院内院外採用
セパゾン散１０mg／ｇ	クロキサゾラム	院内院外採用
セパゾン錠１mg	クロキサゾラム	院外採用
セパゾン錠２mg	クロキサゾラム	院内院外採用
セパミット-Ｒ細粒２％（20mg/g）	ニフェジピン	院内院外採用

ゼビアックスローション2% 10g	オゼノキサシン	院外採用
ゼビアックス油性クリーム2%10g	オゼノキサシン	院外採用
セファランチン末１０mg／ｇ	セファランチン	院内院外採用
ｾﾌｧﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg「ﾄｰﾜ」(ｹﾌﾚｯｸｽ後発)	セファレキシン	院外採用
ゼフィックス錠１００mg	ラミブジン	院外採用
ゼフナートクリーム２％１０ｇ	リラナフタート	院外採用
ゼフナート外用液２％１０mL	リラナフタート	院外採用
セルセプトカプセル２５０mg	ミコフェノール酸モフェチル	院内院外採用
セルタッチパップ７０　６枚/包	フェルビナク	院外採用
セルトラリン錠25mg「JG」(ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ後発)	セルトラリン塩酸塩	院内院外採用
セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	院外採用
セルベックスカプセル５０mg	テプレノン	院外採用
セルベックス細粒１００mg／ｇ	テプレノン	院外採用
セレコキシブ錠100mg「VTRS」(ｾﾚｺｯｸｽ後発)	セレコキシブ	院内院外採用
セレスタミン配合錠	d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ，ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ	院外採用
セレニカＲ顆粒４００mg／ｇ	バルプロ酸ナトリウム	院内院外採用
セレネース細粒１０mg／ｇ	ハロペリドール	院外採用
セロクラール錠１０mg	酒石酸イフェンプロジル	院外採用
ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド	院外採用
センノシド錠12mg「ﾄｰﾜ」(ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞ錠後発)	センノシド	院内院外採用
ソグルーヤ皮下注10mg	ソマプシタン（遺伝子組換え）	院外採用
ソグルーヤ皮下注5mg	ソマプシタン（遺伝子組換え）	院外採用
ソセゴン錠２５mg	塩酸ペンタゾシン	院外採用
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」(ｿﾀｺｰﾙ後発)	ソタロール塩酸塩	院内院外採用
ゾビラックス眼軟膏3% ５ｇ	アシクロビル	院内院外採用
ゾビラックス錠２００mg	アシクロビル	院外採用
ゾビラックス錠４００	アシクロビル	院外採用
ソフラチュール貼付剤10㎝（10×10㎝/枚）	硫酸フラジオマイシン	院内院外採用
ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル マルボキシル	院外採用
ソマトロピンBS皮下注5mg「ｻﾝﾄﾞ」ｼｭｱﾊﾟﾙ	ソマトロピン（遺伝子組換え）	院外採用
ソラナックス錠0.４mg	アルプラゾラム	院外採用
ソランタール錠１００mg	塩酸チアラミド	院外採用
ソリクア配合注ソロスター	ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ・ﾘｷｼｾﾅﾁﾄﾞ	院外採用
ｿﾘﾌｪﾅｼﾝｺﾊｸ酸塩OD錠5mg「ﾄｰﾜ」（ﾍﾞｼｹｱ後発）	コハク酸ソリフェナシン	院内院外採用
ソルコーテフ注射用100mg (注射用水 2mL付)	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ	院内院外採用
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	ｲﾝｽﾘﾝﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸ・ﾘﾗｸﾞﾙﾁﾄﾞ	院外採用
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ｻﾜｲ」(ﾏｲｽﾘｰ後発)	ゾルピデム酒石酸塩	院内院外採用
ダーブロック錠2mg	ダプロデュスタット	院内院外採用
ダーブロック錠4mg	ダプロデュスタット	院内院外採用
ダイアート錠３０mg	アゾセミド	院外採用
ダイアップ坐剤１０mg	ジアゼパム	院内院外採用
ダイアップ坐剤４mg	ジアゼパム	院内院外採用
ダイアップ坐剤６mg	ジアゼパム	院内院外採用
ダイアモックス錠２５０mg	アセタゾラミド	院内院外採用
ダイアモックス末	アセタゾラミド	院外採用
ダイオウ末	ダイオウ	院外採用
ダイフェン配合錠（ﾊﾞｸﾀ後発）	ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ	院内院外採用
タグリッソ錠80mg	オシメルチニブメシル酸塩	院内院外採用
タクロリムス錠０．５mg「ﾄｰﾜ」(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌ後発)	タクロリムス水和物	院外採用
タクロリムス錠１．５mg「ﾄｰﾜ」（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌ後発）	タクロリムス水和物	院外採用
タクロリムス錠１mg「ﾄｰﾜ」（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌ後発）	タクロリムス水和物	院外採用
タクロリムス錠２mg「ﾄｰﾜ」（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌ後発）	タクロリムス水和物	院外採用

タクロリムス錠３mg「ﾄｰﾜ」（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌ後発）	タクロリムス水和物	院外採用
タケキャブ錠１０ｍｇ	ボノプラザンフマル酸塩	院内院外採用
タケキャブ錠２０ｍｇ	ボノプラザンフマル酸塩	院内院外採用
タプコム配合点眼液 2.5mL	ﾀﾌﾙﾌﾟﾛｽﾄ/ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩	院内院外採用
タプロス点眼液0.0015%2.5mL	タフルプロスト	院内院外採用
タベジール錠１mg	フマル酸クレマスチン	院外採用
タミフルＤＳ３０mg／ｇ	リン酸オセルタミビル	院内院外採用
タミフルカプセル７５mg	リン酸オセルタミビル	院内院外採用
ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠0.1mg「ｻﾜｲ」(ﾊﾙﾅｰﾙ後発)	タムスロシン	院内院外採用
ダラシンＴゲル１％１０ｇ	リン酸クリンダマイシン	院内院外採用
ダラシンカプセル１５０mg	クリンダマイシン	院内院外採用
タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外採用
タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院内院外採用
タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外採用
タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	院内院外採用
タリビッド眼軟膏0.3% ３.５ｇ	オフロキサシン	院内院外採用
タリビッド耳科用液0.３％５mL	オフロキサシン	院外採用
タリビッド点眼液0.3% ５mL	オフロキサシン	院外採用
タルセバ錠１５０mg	エルロチニブ	院外採用
タルチレリンOD錠5mg「ｱﾒﾙ」(ｾﾚｼﾞｽﾄ後発)	タルチレリン水和物	院内院外採用
ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠10mg「ﾄｰﾜ」（ｾﾃﾞｨｰﾙ後発）	タンドスピロンクエン酸塩	院内院外採用
ダントリウムカプセル２５mg	ダントロレンナトリウム	院内院外採用
タンニン酸アルブミン「ヤマゼン」M(旧ﾀﾝﾅﾙﾋﾞﾝ)	タンニン酸アルブミン	院内院外採用
タンボコール錠５０mg	酢酸フレカイニド	院外採用
チウラジール錠５０mg	プロピルチオウラシル	院内院外採用
チオラ錠１００mg	チオプロニン	院外採用
チガソンカプセル１０mg	エトレチナート	院外採用
チガソンカプセル２５mg	エトレチナート	院外採用
チキジウム臭化物カプセル10mg「ｻﾜｲ」（ﾁｱﾄﾝ後発）	チキジウム臭化物	院内院外採用
チザニジン錠1mg「日医工」（テルネリン後発）	チザニジン塩酸塩	院内院外採用
チモプトール点眼液0.5% 5mL	マレイン酸チモロール	院内院外採用
チャンピックス錠０.５mg	酒石酸バレニクリン	院外採用
チャンピックス錠１mg	酒石酸バレニクリン	院外採用
チラーヂンS散0.01%	レボチロキシンナトリウム	院内院外採用
チラーヂンS錠12.5μg	ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ	院外採用
チラーヂンＳ錠２５	レボチロキシンナトリウム	院内院外採用
チラーヂンＳ錠５０	レボチロキシンナトリウム	院内院外採用
チロナミン錠２５ug	リオチロニンナトリウム	院外採用
ツイミーグ錠５００ｍｇ	イメグリミン塩酸塩	院内院外採用
ツートラム錠１００ｍｇ	トラマドール塩酸塩	院外採用
ツートラム錠５０ｍｇ	トラマドール塩酸塩	院内院外採用
ツムラ１００大建中湯2.５ｇ包	大建中湯	院内院外採用
ツムラ１０６温経湯2.５ｇ包	ツムラ１０６温経湯2.５ｇ包	院外採用
ツムラ１０７牛車腎気丸2.５ｇ包	牛車腎気丸	院内院外採用
ツムラ１０８人参養栄湯3.0g包	人参養栄湯	院内院外採用
ツムラ１０柴胡桂枝湯2.５ｇ包	柴胡桂枝湯	院外採用
ツムラ１１１清心蓮子飲2.５ｇ包	清心蓮子飲	院外採用
ツムラ１１４柴苓湯3.０ｇ包	ツムラ１１４柴苓湯3.０ｇ包	院内院外採用
ツムラ１１柴胡桂枝乾姜湯2.５ｇ包	柴胡桂枝乾姜湯	院外採用
ツムラ１２柴胡加竜骨牡蠣湯2.５ｇ包	柴胡加竜骨牡蠣湯	院内院外採用
ツムラ１３４桂枝加芍薬大黄湯２．５ｇ包	桂枝加芍薬大黄湯	院外採用
ツムラ１３７加味帰脾湯2.５ｇ包	加味帰脾湯	院外採用

ツムラ１３８桔梗湯2.5ｇ包	漢方製剤	院外採用
ツムラ１４半夏瀉心湯2.5ｇ包	半夏瀉心湯	院内院外採用
ツムラ１５黄連解毒湯2.5ｇ包	黄連解毒湯	院外採用
ツムラ１６半夏厚朴湯2.5ｇ包	半夏厚朴湯	院内院外採用
ツムラ１７五苓散2.5ｇ包	五苓散	院内院外採用
ツムラ１８桂枝加朮附湯2.5ｇ包	桂枝加朮附湯	院外採用
ツムラ１９小青竜湯3.0ｇ包	小青竜湯	院内院外採用
ツムラ１葛根湯2.5ｇ包	ツムラ１葛根湯	院内院外採用
ツムラ２０防已黄耆湯2.5ｇ包	防已黄耆湯	院外採用
ツムラ２３当帰芍薬散2.5ｇ包	当帰芍薬散	院内院外採用
ツムラ２４加味逍遙散2.5ｇ包	加味逍遙散	院内院外採用
ツムラ２５桂枝茯苓丸2.5ｇ包	桂枝茯苓丸	院内院外採用
ツムラ２９麦門冬湯3.0ｇ包	麦門冬湯	院内院外採用
ツムラ３１呉茱萸湯2.5g包	呉茱萸湯	院外採用
ツムラ３４白虎加人参湯3.0ｇ包	ツムラ３４白虎加人参湯	院内院外採用
ツムラ３８当帰四逆加呉茱萸生姜湯２．５ｇ包	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯	院外採用
ツムラ３９苓桂朮甘湯2.5ｇ包	ツムラ３９苓桂朮甘湯2.5ｇ包	院外採用
ツムラ４０猪苓湯2.5ｇ包	猪苓湯	院内院外採用
ツムラ４１補中益気湯2.5ｇ包	補中益気湯	院内院外採用
ツムラ４３六君子湯2.5ｇ包	ツムラ４３六君子湯2.5ｇ包	院内院外採用
ツムラ４７釣藤散2.5ｇ包	釣藤散	院外採用
ツムラ４８十全大補湯2.5ｇ包	十全大補湯	院内院外採用
ツムラ５１潤腸湯２．５ｇ包	潤腸湯	院外採用
ツムラ５４抑肝散2.5ｇ包	抑肝散	院内院外採用
ツムラ５６五淋散2.5ｇ包	五淋散	院外採用
ツムラ５７温清飲2.5ｇ包	ツムラ５７温清飲2.5ｇ包	院外採用
ツムラ６２防風通聖散2.5ｇ包	防風通聖散	院外採用
ツムラ６８芍薬甘草湯2.5ｇ包	芍薬甘草湯	院内院外採用
ツムラ６十味敗毒湯2.5ｇ包	十味敗毒湯	院外採用
ツムラ７０香蘇散2.5g包	香蘇散エキス	院外採用
ツムラ７八味地黄丸2.5ｇ包	八味地黄丸	院内院外採用
ツムラ89治打撲一方2.5g包	治打撲一方	院内院外採用
ツムラ９０清肺湯3.0ｇ包	清肺湯	院外採用
ツムラ９９小建中湯2.5ｇ包	小建中湯	院内院外採用
ツムラ９小柴胡湯2.5ｇ包	小柴胡湯	院外採用
ツルバダ配合錠	ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ，ﾌﾏﾙ酸ﾃﾉﾎﾋﾞﾙｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼ	院内院外採用
ティーエスワン配合OD錠T20	ﾃｶﾞﾌｰﾙ、ｷﾞﾒﾗｼﾙ、ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	院外採用
ティーエスワン配合OD錠T25	ﾃｶﾞﾌｰﾙ、ｷﾞﾒﾗｼﾙ、ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	院外採用
ディフェリンゲル０．１％１５ｇ	アダパレン	院内院外採用
デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	院内院外採用
デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	院内院外採用
テオドール錠１００mg	テオフィリン	院内院外採用
テオドール錠２００mg	テオフィリン	院外採用
ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ小児用20%「ｻﾜｲ」（ﾃｵﾄﾞｰﾙ後発）	テオフィリン	院内院外採用
テオロング錠１００mg	テオフィリン	院外採用
デカドロン錠0.5 mg	デキサメタゾン	院内院外採用
デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	院内院外採用
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ口腔用軟膏0.1%「NK」5g（旧ﾃﾞｷｻﾙﾁﾝ）	デキサメタゾン	院内院外採用
ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ錠15ｍｇ「ﾄｰﾜ」（ﾒｼﾞｺﾝ後発）	デキストロメトルファン臭化水素	院内院外採用
テグレトール細粒５００mg／ｇ	カルバマゼピン	院内院外採用
テグレトール錠１００mg	カルバマゼピン	院外採用
テグレトール錠２００mg	カルバマゼピン	院外採用

デザレックス錠5mg	デスロラタジン	院内院外採用
テシプール錠１mg	マレイン酸セチプチリン	院内院外採用
デスパコーワ口腔用クリーム５g	塩酸ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ,ｻﾘﾁﾙ酸ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐ	院外採用
デスモプレシン点鼻ｽﾌﾟﾚｰ2.5μg「ﾌｪﾘﾝｸﾞ」	デスモプレシン酢酸塩水和物	院外採用
デタントールＲ錠３mg	塩酸ブナゾシン	院外採用
デタントール点眼液0.０１％５mL	塩酸ブナゾシン	院外採用
テトラミド錠１０mg	塩酸ミアンセリン	院内院外採用
テトラミド錠３０mg	塩酸ミアンセリン	院内院外採用
テネリアOD錠20mg	ﾃﾈｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ臭化水素酸塩水和物	院内院外採用
テネリアOD錠40mg	ﾃﾈｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ臭化水素酸塩水和物	院外採用
テノゼット錠３００ｍｇ	テノホビル	院外採用
デノタスチュアブル配合錠	炭酸ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ/ｺﾚｶﾙｼﾌｪﾛｰﾙ	院内院外採用
デパケンＲ錠１００mg	バルプロ酸ナトリウム	院外採用
デパケンＲ錠２００mg	バルプロ酸ナトリウム	院内院外採用
デパケンシロップ５％(50mg/mL)	バルプロ酸ナトリウム	院内院外採用
デパケン細粒40％ （400mg/g）	バルプロ酸ナトリウム	院内院外採用
デパケン錠１００mg	バルプロ酸ナトリウム	院外採用
デパケン錠２００mg	バルプロ酸ナトリウム	院外採用
デパス細粒１％ （10mg/ｇ）	エチゾラム	院外採用
デパス錠0.５mg	エチゾラム	院外採用
テビケイ錠５０ｍｇ	ドルテグラビル	院内院外採用
ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg「ﾄｰﾜ」(ｾﾙﾍﾞｯｸｽ後発)	テプレノン	院内院外採用
ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ細粒100mg/g「ﾄｰﾜ」(ｾﾙﾍﾞｯｸｽ細粒後発)	テプレノン	院内院外採用
デベルザ錠20mg	トホグリフロジン水和物	院外採用
テモゾロミド錠100mg「NK」（ﾃﾓﾀﾞｰﾙ後発）	テモゾロミド	院内院外採用
テモゾロミド錠20mg「NK」（ﾃﾓﾀﾞｰﾙ後発）	テモゾロミド	院内院外採用
デュアック配合ゲル 10g	ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ・過酸化ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙｹﾞﾙ	院外採用
デュオトラバ配合点眼剤2.5mL/瓶	トラボプロスト、チモロール	院外採用
デュピクセント皮下注３００ｍｇペン	デュピルマブ（遺伝子組換え）	院内院外採用
デュファストン錠５mg	ジドロゲステロン	院内院外採用
デュロキセチンｶﾌﾟｾﾙ20mg「明治」(ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀ後発)	デュロキセチン塩酸塩	院内院外採用
テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有） ２５ｇ	塩酸オキシテトラサイクリン	院内院外採用
ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞBS皮下注ｷｯﾄ600μg「ﾓﾁﾀﾞ」	ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ（遺伝子組換え）	院外採用
ﾃﾘﾎﾞﾝ皮下注28.2μgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ	テリパラチド酢酸塩	院内院外採用
テリルジー１００エリプタ３０吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エ	院外採用
テリルジー２００エリプタ３０吸入用	ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ/ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ/ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ	院内院外採用
テルビナフィン錠125mg「VTRS」(ﾗﾐｼｰﾙ後発)	テルビナフィン塩酸塩	院内院外採用
テルミサルタン錠40mg「三和」（ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ後発）	テルミサルタン	院内院外採用
トアラセット配合錠「Me」(ﾄﾗﾑｾｯﾄ後発)	ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩・ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ	院内院外採用
ドキサゾシン錠1mg「ﾄｰﾜ」（ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ後発）	ドキサゾシンメシル酸塩	院内院外採用
ドグマチール細粒50%	スルピリド	院外採用
ドグマチール錠１００mg	スルピリド	院外採用
ドグマチール錠２００mg	スルピリド	院外採用
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg「ﾄｰﾜ」（ﾕﾍﾞﾗN後発）	トコフェロールニコチン酸エステ	院内院外採用
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ錠50ｍｇ「ﾄｰﾜ」（ﾕﾍﾞﾗ後発）	トコフェロール酢酸エステル	院内院外採用
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ｱﾒﾙ」（ｱﾘｾﾌﾟﾄ後発）	ドネペジル塩酸塩	院内院外採用
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ｱﾒﾙ」（ｱﾘｾﾌﾟﾄ後発）	ドネペジル塩酸塩	院内院外採用
ドパコール配合錠L100 （メネシット後発）	レボドパ・カルビドパ水和物	院内院外採用
トビエース錠4mg	フェソテロジンフマル酸塩	院外採用
ドプスOD錠 100mg	ドロキシドパ	院内院外採用
ドプスOD錠 200mg	ドロキシドパ	院内院外採用
トフラニール錠１０mg	塩酸イミプラミン	院外採用

ドボネックス軟膏50μg/g１０ｇ	カルシポトリオール	院外採用
ドボベットゲル１５ｇ	ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ・ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ	院外採用
ドボベットフォーム 60g	ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ･ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ	院外採用
ドボベット軟膏１５ｇ	ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ･ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ	院内院外採用
ドラール錠１５mg	クアゼパム	院外採用
トラセミドOD錠４mg「TE」(ﾙﾌﾟﾗｯｸ後発)	トラセミド	院内院外採用
トラゼンタ錠 5mg	リナグリプチン	院内院外採用
トラゾドン塩酸塩錠25mg「ｱﾒﾙ」(ﾃﾞｼﾞﾚﾙ後発)	トラゾドン塩酸塩	院内院外採用
ﾄﾗﾃﾞｨｱﾝｽ配合錠AP(ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ5mg･ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ10mg)	ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ・ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ	院外採用
ﾄﾗﾃﾞｨｱﾝｽ配合錠BP(ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ5mg･ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ25mg)	ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ・ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ	院外採用
トラネキサム酸錠250mg「日医工」（ﾄﾗﾝｻﾐﾝ後発）	トラネキサム酸	院内院外採用
トラバタンズ点眼液0.004% 2.5mL	トラボプロスト	院内院外採用
トラベルミン配合錠	ｻﾘﾁﾙ酸ｼﾞ゛ﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ	院内院外採用
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 10mL/本	塩酸トラマゾリン	院内院外採用
トラマドール塩酸塩OD錠25mg｢KO｣(ﾄﾗﾏｰﾙ後発)	トラマドール塩酸塩	院内院外採用
トランサミン散５０％ （500mg/ｇ）	トラネキサム酸	院内院外採用
トリアゾラム錠0.125mg「日医工」(ﾊﾙｼｵﾝ後発)	トリアゾラム	院内院外採用
ﾄﾘｸﾛﾘｰﾙｼﾛｯﾌﾟ10% (100mg/mL)	トリクロホスナトリウム	院内院外採用
ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠1mg「ﾄｰﾜ」（ﾌﾙｲﾄﾗﾝ後発）	トリクロルメチアジド	院内院外採用
ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢NIG｣（ﾌﾙｲﾄﾗﾝ後発）	トリクロルメチアジド	院内院外採用
トリプタノール錠１０mg	塩酸アミトリプチリン	院内院外採用
トリプタノール錠２５mg	塩酸アミトリプチリン	院内院外採用
トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「ｱﾒﾙ」（ｱｰﾃﾝ後発）	トリヘキシフェニジル塩酸塩	院内院外採用
ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠100mg｢ﾄｰﾜ｣（セレキノン後発）	マレイン酸トリメブチン	院内院外採用
トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	院外採用
トルソプト点眼液１％５mL	塩酸ドルゾラミド	院内院外採用
トルツ皮下注80mgオートインジェクター	イキセキズマブ	院外採用
ドルナー錠２０ug	ベラプロストナトリウム	院外採用
トルバプタンOD錠7.5mg｢ｵｰﾂｶ｣(ｻﾑｽｶ後発)	トルバプタン	院内院外採用
ドルモロール配合点眼液「TS」 5mL（ｺｿﾌﾟﾄ後発）	ドルゾラミド・チモロール	院内院外採用
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)	院内院外採用
トレシーバ注フレックスタッチ	インスリン　デクルデク	院内院外採用
トレドミン錠２５mg	塩酸ミルナシプラン	院内院外採用
トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	院内院外採用
トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド	院外採用
ドンペリドン錠10mg「日新」(ﾅｳｾﾞﾘﾝ後発)	ドンペリドン	院内院外採用
ナイキサン錠１００mg	ナプロキセン	院内院外採用
ナウゼリン坐剤１０mg	ドンペリドン	院内院外採用
ナウゼリン坐剤３０mg	ドンペリドン	院内院外採用
ナウゼリン坐剤６０mg	ドンペリドン	院内院外採用
ﾅｼﾞﾌﾛｷｻｼﾝﾛｰｼｮﾝ1%「ﾄｰﾜ」 20mL (ｱｸｱﾁﾑ後発)	ナジフロキサシン	院内院外採用
ナゼアＯＤ錠0.１mg	塩酸ラモセトロン	院外採用
ナディック錠３０mg	ナドロール	院外採用
ナトリックス錠１mg	インダパミド	院内院外採用
ナパゲルンローション3%５０mL	フェルビナク	院外採用
ナフトピジルOD錠75mg「ｻﾜｲ」（ﾌﾘﾊﾞｽ後発）	ナフトピジル	院内院外採用
ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内院外採用
ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内院外採用
ナルティークＯＤ錠７５ｍｇ	リメゲパント硫酸塩水和物	院外採用
ﾅﾙﾌﾗﾌｨﾝ塩酸塩OD錠2.5μｇ｢ﾌｿｰ｣(ﾚﾐｯﾁ後発)	ナルフラフィン塩酸塩	院内院外採用
ナルラピド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内院外採用
ナルラピド錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内院外採用

ニコチネルＴＴＳ１０	ニコチン	院外採用
ニコチネルＴＴＳ２０	ニコチン	院外採用
ニコチネルＴＴＳ３０	ニコチン	院外採用
ニコランジル錠5mg「ｻﾜｲ」(ｼｸﾞﾏｰﾄ錠後発)	ニコランジル	院内院外採用
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」（ｻｱﾐｵﾝ後発）	ニセルゴリン	院内院外採用
ニゾラールクリーム2% １０ｇ	ケトコナゾール	院内院外採用
ニゾラールローション２％１０ｇ	ケトコナゾール	院外採用
ニトロールＲカプセル２０mg	硝酸イソソルビド	院内院外採用
ニトロダームＴＴＳ 25mg	ニトログリセリン	院内院外採用
ニトロペン舌下錠０.３mg	ニトログリセリン	院内院外採用
ニバジール錠２mg	ニルバジピン	院外採用
ニフェジピンCR錠20mg「ﾄｰﾜ」(ｱﾀﾞﾗｰﾄCR後発)	ニフェジピン	院内院外採用
ニフェジピンCR錠40mg「ﾄｰﾜ」(ｱﾀﾞﾗｰﾄCR後発)	ニフェジピン	院外採用
ニフラン点眼液0.１％５mL	プラノプロフェン	院内院外採用
ニュープロパッチ 13.5mg	ロチゴチン	院外採用
ニュープロパッチ 2.25mg	ロチゴチン	院外採用
ニュープロパッチ 4.5mg	ロチゴチン	院外採用
ニュープロパッチ 9mg	ロチゴチン	院内院外採用
ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	院外採用
ネイリンカプセル100mg	ﾎｽﾗﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ L-ﾘｼﾝｴﾀﾉｰﾙ付加物	院外採用
ネオーラル内用液10% 50mL	シクロスポリン	院内院外採用
ネオキシテープ73.5mg（７枚/袋）	オキシブチニン	院外採用
ネオシネジン点眼液５％１０mL	塩酸フェニレフリン	院内院外採用
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	ｴｿﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾏｸﾞﾈｼｳﾑ水和物	院内院外採用
ネキシウム懸濁用顆粒分包２０ｍｇ	ｴｿﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾏｸﾞﾈｼｳﾑ水和物	院外採用
ネクセトール錠180ｍｇ	ベムペド酸	院外採用
ネシーナ錠12.5mg	安息香酸アログリプチン	院外採用
ネシーナ錠25mg	安息香酸アログリプチン	院外採用
ネバナック懸濁性点眼液0.1%5mL	ネパフェナク	院内院外採用
ネリザ坐剤(ﾈﾘﾌﾟﾛｸﾄ後発)	ｼﾞﾌﾙｺﾙﾄﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ・ﾘﾄﾞｶｲﾝ	院外採用
ネリゾナクリーム0.1%１０ｇ	吉草酸ジフルコルトロン	院外採用
ネリゾナﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾘｰﾑ0.1% 10g	吉草酸ジフルコルトロン	院内院外採用
ネリゾナ軟膏0.1%１０ｇ	吉草酸ジフルコルトロン	院外採用
ノイキノン錠１０mg	ユビデカレノン	院内院外採用
ノイロトロピン錠４単位	ﾜｸｼﾆｱｳｲﾙｽ接種家兎炎症皮膚抽出	院内院外採用
ノイロビタン配合錠	ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ，ﾋﾞﾀﾐﾝB2,B6,B12	院外採用
ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	院外採用
ノービア錠１００ｍｇ	リトナビル	院内院外採用
ノクサフィル錠100mg	ポサコナゾール	院内院外採用
ノバミン錠５mg	プロクロルペラジン	院内院外採用
ノフロ点眼液0.３％５mL	ノルフロキサシン	院外採用
ノベルジン顆粒5%(50mg/g)	酢酸亜鉛水和物	院外採用
ノボラピッド30ミックス注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ	インスリンアスパルト，リスプロ	院外採用
ノボラピッド50ミックス注フレックスペン	ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ	院外採用
ノボラピッド注フレックスタッチ	インスリンアスパルト	院外採用
ノボラピッド注ペンフィル	インスリンアスパルト（遺伝子組	院外採用
ノボリン３０Ｒ注フレックスペン	ヒトインスリン（遺伝子組換え）	院外採用
ノボリンＮ注フレックスペン	ヒトインスリン（遺伝子組換え）	院外採用
ノボリンＲ注フレックスペン	ラタモキセフナトリウム	院内院外採用
ノルスパンテープ１０ｍｇ	ブプレノルフィン	院外採用
ノルスパンテープ５ｍｇ	ブプレノルフィン	院外採用
ノルディトロピン フレックスプロ注10mg	ソマトロピン	院外採用

ノルディトロピン フレックスプロ注15mg	ソマトロピン	院外採用
ノルバデックス錠２０mg	クエン酸タモキシフェン	院外採用
ハーフジゴキシンＫＹ錠0.125mg	ジゴキシン	院内院外採用
パーロデル錠2.5mg	メシル酸ブロモクリプチン	院外採用
バイアグラ錠25mg	シルデナフィルクエン酸塩	院外採用
バイアグラ錠50mg	シルデナフィルクエン酸塩	院外採用
バイアスピリン錠１００ｍｇ	アスピリン	院内院外採用
ハイドレアカプセル５００mg	ヒドロキシカルバミド	院内院外採用
ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜ点眼液0.25% 5mL	ニプラジロール	院外採用
ハイペン錠２００mg	エトドラク	院外採用
ハイボン錠２０mg	酪酸リボフラビン	院外採用
パキシルCR錠 12.5mg	パロキセチン	院内院外採用
バクスミー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	院内院外採用
バクタミニ配合錠（バクタ 1/4量）	ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ	院内院外採用
バクタ配合錠	ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ，ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ	院外採用
バクタ配合顆粒	ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ，ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ	院内院外採用
パスタロンソフト軟膏10% 20g	尿素	院内院外採用
バソメット錠0.５mg	塩酸テラゾシン	院外採用
ハッカ油２０mL／本	ハッカ油	院内院外採用
パナルジン錠１００mg	塩酸チクロピジン	院外採用
バフセオ錠150mg	バダデュスタット	院外採用
バフセオ錠300mg	バダデュスタット	院外採用
バラシクロビル錠500mg｢ｻﾜｲ｣(ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ後発)	バラシクロビル塩酸塩	院内院外採用
パラミヂンカプセル３００mg	ブコローム	院外採用
バリキサ錠４５０mg	バルガンシクロビル	院内院外採用
バルサルタン錠80mg「オーハラ」(ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ後発)	バルサルタン	院内院外採用
ﾊﾞﾙﾐｺｰﾄ200μgﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ５６吸入	ブデソニド	院内院外採用
パルミコート吸入液0.5mg2mL	ブデソニド	院内院外採用
パルモディアXR錠0.2mg	ペマフィブラート	院内院外採用
パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート	院外採用
パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	院外採用
ハルロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩	院外採用
ハルロピテープ32mg	ロピニロール塩酸塩	院外採用
ハルロピテープ8mg	ロピニロール塩酸塩	院外採用
ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠1mg「ｱﾒﾙ」(ｾﾚﾈｰｽ後発)	ハロペリドール	院内院外採用
パンクレアチン	パンクレアチン	院内院外採用
バンコマイシン塩酸塩散0.5ｇ「ｻﾜｲ」 500mg/瓶	塩酸バンコマイシン	院内院外採用
パンテチン散20%｢NIG｣(ﾊﾟﾝﾄｼﾝ後発)	パンテチン	院内院外採用
パントシン錠３０mg	パンテチン	院外採用
パンビタン末	総合ビタミン	院内院外採用
ビ・シフロール錠０.５mg	塩酸プラミペキソール水和物	院外採用
ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na0.85眼粘弾剤1%「ｱﾙｺﾝ」(旧ﾌﾟﾛﾋﾞｽｸ)	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院内院外採用
ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na点眼液0.1%｢ｾﾝｼﾞｭ｣5mL(ﾋｱﾚｲﾝ後発)	ヒアルロン酸ナトリウム	院内院外採用
ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑPF点眼液0.1%「日点」5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	院外採用
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL	ヒアルロン酸ナトリウム	院外採用
ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL	ヒアルロン酸ナトリウム	院内院外採用
ピーゼットシー糖衣錠４mg	ペルフェナジン	院外採用
ピートル顆粒分包２５０ｍｇ	スクロオキシ水酸化鉄	院内院外採用
ピオグリタゾン錠15mg「武田ﾃﾊﾞ」(ｱｸﾄｽ後発)	ピオグリタゾン塩酸塩	院内院外採用
ビオスリー配合OD錠	酪酸菌配合剤	院外採用
ビオフェルミンＲ散(ｴﾝﾃﾛﾉﾝR後発)	耐性乳酸菌製剤	院内院外採用
ビオフェルミン散剤1g	ビフィズス菌	院外採用

ビオフェルミン錠剤(ﾗｯｸﾋﾞｰ後発)	ビフィズス菌製剤	院内院外採用
ビオフェルミン配合散	ラクトミン製剤	院外採用
ビカルタミドOD錠80mg「NK」(ｶﾝﾃﾞｯｸｽ後発)	ビカルタミド	院内院外採用
ビクシリンS配合錠	アンピシリン，クロキサシリン	院外採用
ビクタルビ配合錠	ﾋﾞｸﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙ・ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ・ﾃﾉﾎﾋﾞﾙｱﾗﾌ	院内院外採用
ﾋﾞｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ内用液0.75%「JG」10mL(ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ後発)	ピコスルファートナトリウム	院内院外採用
ヒスロンH錠２００mg	酢酸メドロキシプロゲステロン	院内院外採用
ヒスロン錠５mg	酢酸メドロキシプロゲステロン	院外採用
ビソノテープ２ｍｇ	ビソプロロール	院内院外採用
ビソノテープ4mg	ビソプロロール	院内院外採用
ビソノテープ８ｍｇ	ビソプロロール	院外採用
ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠0.625mg「ﾄｰﾜ」(ﾒｲﾝﾃｰﾄ後発)	ビソプロロールフマル酸塩	院内院外採用
ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠2.5mg「ﾄｰﾜ」(ﾒｲﾝﾃｰﾄ後発)	ビソプロロールフマル酸塩	院内院外採用
ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠5mg「ﾄｰﾜ」(ﾒｲﾝﾃｰﾄ後発)	ビソプロロールフマル酸塩	院内院外採用
ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑOD錠2mg「KOG」(ﾘﾊﾞﾛ後発)	ピタバスタチンカルシウム	院内院外採用
ビタメジン配合カプセルB25	Ｂ1，Ｂ6，Ｂ12混合	院外採用
ビダラビン軟膏3%「ﾄｰﾜ」５ｇ(ｱﾗｾﾅA後発)	ビダラビン	院内院外採用
ヒダントールF配合錠	ﾌｪﾆﾄｲﾝ，安ﾅｶ，ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ	院外採用
ヒダントール錠２５mg	フェニトイン	院内院外採用
ピドキサール錠１０mg	リン酸ピリドキサール	院内院外採用
ﾋﾄﾞﾛｷｼｸﾛﾛｷﾝ硫酸塩錠200mg「DSEP」(ﾌﾟﾗｹﾆﾙ後発)	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	院内院外採用
ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」	ヒドロクロロチアジド	院内院外採用
ビブラマイシン錠１００mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	院内院外採用
ビプレッソ徐放錠１５０ｍｇ	クエチアピンフマル酸塩	院外採用
ビプレッソ徐放錠50mg	クエチアピンフマル酸塩	院内院外採用
ビベスピｴｱﾛｽﾌｨｱ １２０吸入	ｸﾞﾘｺﾄﾛﾋﾞｳﾑ・ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ	院外採用
ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ塩酸塩錠1mg「ｱﾒﾙ」(ｱｷﾈﾄﾝ後発)	ビペリデン塩酸塩	院内院外採用
ピマリシン眼軟膏1%「ｾﾝｼﾞｭ」5g	ピマリシン	院内院外採用
ビムパットドライシロップ10%	ラコサミド	院外採用
ビムパット錠50mg	ラコサミド	院外採用
ピモベンダン錠1.25mg「TE」(ｱｶﾙﾃﾞｨ後発)	ピモベンダン	院内院外採用
ヒューマリンＮ注１００単位/ｍＬ	イソフェンインスリン水性懸濁	院外採用
ヒューマリンＲ注１００単位/ｍＬ	ヒトインスリン	院内院外採用
ﾋｭｰﾏﾛｸﾞﾐｯｸｽ２５注ミリオペン	インスリンリスプロ（遺伝子組換	院外採用
ﾋｭｰﾏﾛｸﾞﾐｯｸｽ５０注ｶｰﾄ３００Ｕ	インスリンリスプロ（遺伝子組換	院外採用
ﾋｭｰﾏﾛｸﾞﾐｯｸｽ５０注ミリオペン	インスリンリスプロ（遺伝子組換	院外採用
ヒューマログ注カート３００Ｕ	インスリンリスプロ（遺伝子組換	院外採用
ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロ（遺伝子組換	院外採用
ビヨントラ錠400mg	アコラミジス塩酸塩	院外採用
ビラノアOD錠20mg	ビラスチン	院内院外採用
ﾋﾞﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ25mg「DSEP」(ｻﾝﾘｽﾞﾑ後発)	ピルシカイニド塩酸塩	院内院外採用
ﾋﾞﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg「DSEP」(ｻﾝﾘｽﾞﾑ後発)	ピルシカイニド塩酸塩	院内院外採用
ビルダグリプチン錠50mg「トーワ」(エクア後発)	ビルダグリプチン	院内院外採用
ビルタサ懸濁用散分包8.4g	パチロマーソルビテクスカルシウ	院内院外採用
ヒルドイドクリーム0.3% ２５ｇ	ヘパリン類似物質	院外採用
ヒルドイドソフト軟膏０．３％２５ｇ	ヘパリンナトリウム	院外採用
ヒルドイドﾛｰｼｮﾝ0.3% 150gﾎﾟﾝﾌﾟ付ﾎﾞﾄﾙ	ヘパリン類似物質	院外採用
ヒルドイドローション０．３％２５ｇ	ヘパリンナトリウム	院内院外採用
ヒルドイドローション０．３％５０ｇ	ヘパリン類似物質	院外採用
ヒルナミン細粒１００mg／ｇ	レボメプロマジン	院内院外採用
ヒルナミン錠２５mg	レボメプロマジン	院内院外採用
ヒルナミン錠５mg	レボメプロマジン	院内院外採用

ビレーズトリｴｱﾛｽﾌｨｱ １２０吸入	ﾌﾞﾃﾞｿﾞﾆﾄﾞ・ｸﾞﾘｺﾄﾛﾋﾟｳﾑ・ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ	院内院外採用
ピレチア細粒10%（１００mg/g）	塩酸プロメタジン	院外採用
ピレチア錠２５mg	塩酸プロメタジン	院内院外採用
ﾋﾞﾚﾉｷｼﾝ懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL(旧ｶﾘｰﾕﾆ)	ピレノキシン	院内院外採用
ビンマックカプセル61mg	タファミジス	院外採用
ファセンラ皮下注30mgペン	ベンラリズマブ（遺伝子組換え）	院内院外採用
ファムビル錠２５０mg	ファムシクロビル	院外採用
ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg「EMEC」(ｶﾞｽﾀｰD20mg後発)	ファモチジン	院内院外採用
ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ散100mg/g「ｻﾜｲ」(ｶﾞｽﾀｰ散後発)	ファモチジン	院内院外採用
ファロム錠２００mg	ファロペネムナトリウム	院外採用
ファンギゾンシロップ 100mg/mL	アムホテリシンＢ	院内院外採用
フィアスプ注 フレックスタッチ	ｲﾝｽﾘﾝｱｽﾊﾟﾙﾄ(遺伝子組換え)	院内院外採用
フィアスプ注 ペンフィル	ｲﾝｽﾘﾝｱｽﾊﾟﾙﾄ(遺伝子組換え)	院外採用
フィアスプ注100単位/mL 10mL	ｲﾝｽﾘﾝｱｽﾊﾟﾙﾄ(遺伝子組換え)	院外採用
フィコンパ細粒1% 10mg/g	ペランパネル水和物	院内院外採用
フィコンパ錠２ｍｇ	ペランパネル水和物	院内院外採用
ブイタマークリーム１%15g/本		院外採用
フィブラストスプレー５００ug	トラフェルミン	院内院外採用
フェアストン錠４０mg	クエン酸トレミフェン	院外採用
ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠30mg「SANIK」(ｱﾚｸﾞﾗ後発)	ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩	院内院外採用
ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠60mg「SANIK」(ｱﾚｸﾞﾗ後発)	ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩	院内院外採用
フェノバール散１０％ （100mg/ｇ）	フェノバルビタール	院内院外採用
フェノバール錠３０mg	フェノバルビタール	院外採用
ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠53.3ｍｇ「武田ﾃﾊﾞ」 (ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙ後発)	フェノフィブラート	院内院外採用
フェブキソスタット錠10mg「DSEP」(ﾌｪﾌﾞﾘｸ後発)	フェブキソスタット	院内院外採用
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(ﾌｪﾌﾞﾘｸ後発)	フェブキソスタット	院内院外採用
ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸｽﾁｯｸ軟膏3%「三笠」40g (旧ｽﾐﾙｽﾁｯｸ)	フェルビナク	院内院外採用
フェロミア錠５０mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	院外採用
フェントステープ０．５ｍｇ	フェンタニルクエン酸塩	院内院外採用
フェントステープ1mg	クエン酸フェンタニル	院内院外採用
フェントステープ2mg	クエン酸フェンタニル	院内院外採用
フェントステープ４ｍｇ	フェンタニルクエン酸塩	院外採用
フェントステープ６ｍｇ	クエン酸フェンタニル	院外採用
フェントステープ８ｍｇ	フェンタニルクエン酸塩	院外採用
フォシーガ錠 ５ｍｇ	ダパグリフロジン	院内院外採用
フォシーガ錠１０ｍｇ	ダパグリフロジンプロピレングリ	院内院外採用
フォゼベル錠10mg	テナパノル塩酸塩	院外採用
フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩	院外採用
フォリアミン錠５mg	葉酸	院内院外採用
ブコラム口腔用液５ｍｇ１mL	ミダゾラム	院外採用
フシジンレオ軟膏2% １０ｇ	フシジン酸ナトリウム	院内院外採用
ブシ末（調剤用）「ツムラ」	修治ブシ末	院外採用
ブスコパン錠１０mg	臭化ブチルスコポラミン	院内院外採用
フスタゾール糖衣錠10mg	クロペラスチン	院外採用
ブセレリン点鼻液0.15%「F」(ｽﾌﾟﾚｷｭｱ後発)	ブセレリン酢酸塩	院内院外採用
ブドウ糖「フソー」	ブドウ糖	院内院外採用
プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	院外採用
プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラート	院外採用
プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラート	院外採用
フラジール内服錠２５０mg	メトロニダゾール	院内院外採用
フラジール腟錠２５０mg	メトロニダゾール	院内院外採用
ﾌﾟﾗｽｸﾞﾚﾙ錠3.75ｍｇ「DSEP」 (ｴﾌｨｴﾝﾄ後発)	プラスグレル	院内院外採用

ブラダロン錠２００mg	塩酸フラボキサート	院外採用
プラノバール配合錠	ノルゲストレルエチニルエストラ	院外採用
プラバスタチンNa錠10mg「Me」(メバロチン後発)	プラバスタチンナトリウム	院内院外採用
フランドルテープ４０mg／枚	硝酸イソソルビド	院内院外採用
プランルカストDS 10% 「日医工」(オノン後発)	プランルカスト水和物	院内院外採用
フリーハンズHMEフロー(8221)(30個/箱)	人工鼻	院外採用
フリーハンズHMEモイスト(8220)(30個/箱)	人工鼻	院外採用
ブリィビアクト錠２５ｍｇ	ブリーバラセタム	院外採用
プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン	院外採用
ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ点眼液0.1%｢SEC｣5mL (ｱｲﾌｧｶﾞﾝ後発)	ブリモニジン	院内院外採用
プリモボラン錠５mg	酢酸メテノロン	院外採用
ﾌﾞﾘﾝｿﾞﾗﾐﾄﾞ懸濁性点眼液1%｢ｻﾝﾄﾞ｣5mL(ｴｲｿﾞﾌﾟﾄ後発)	ブリンゾラミド	院内院外採用
プリンペラン細粒２％ (20mg/g)	メトクロプラミド	院内院外採用
プリンペラン錠５mg	メトクロプラミド	院内院外採用
ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ｻﾜｲ｣(ｼﾞﾌﾙｶﾝ100mg後発)	フルコナゾール	院内院外採用
ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｻﾜｲ｣(ｼﾞﾌﾙｶﾝ50mg後発)	フルコナゾール	院内院外採用
フルスタン錠0.３ug	ファレカルシトリオール	院外採用
ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ錠25mg「ﾄｰﾜ」 (ｱﾘﾅﾐﾝF後発)	フルスルチアミン	院内院外採用
フルタイド２００ディスカス	プロピオン酸フルチカゾン	院外採用
ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ点鼻液27.5μg｢武田ﾃﾊﾞ｣56噴霧(ｱﾗﾐｽﾄ後発)	フルチカゾンフランカルボン酸	院内院外採用
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ/ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ	院内院外採用
フルニトラゼパム錠1mg｢ｱﾒﾙ｣(ｻｲﾚｰｽ後発)	フルニトラゼパム	院内院外採用
ブルフェン錠１００mg	イブプロフェン	院外採用
ブルフェン錠２００mg	イブプロフェン	院外採用
ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠25mg｢ｱﾒﾙ｣(ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ後発)	フルボキサミンマレイン酸塩	院内院外採用
フルメタクリーム１０ｇ	フランカルボン酸モメタゾン	院外採用
フルメタローション１０ｇ	フランカルボン酸モメタゾン	院外採用
フルメタ軟膏１０ｇ	フランカルボン酸モメタゾン	院内院外採用
フルメトロン0.０２％５mL	フルオロメトロン	院内院外採用
フルメトロン0.１％５mL	フルオロメトロン	院内院外採用
プレガバリンOD錠25mg「VTRS」 (ﾘﾘｶ後発)	プレガバリン	院内院外採用
プレガバリンOD錠75mg「VTRS」 (ﾘﾘｶ後発)	プレガバリン	院内院外採用
フレキシダーム円形(7253)(20枚入)	整形外科用テープ	院外採用
フレキシダーム楕円形(7254)(20枚入)	整形外科用テープ	院外採用
フレキシダーム楕円形(7254JP)(15枚入)	整形外科用テープ	院外採用
ブレディニンOD錠50	ミゾリビン	院内院外採用
プレドニゾロン散「タケダ」1%10mg/g	プレドニゾロン	院内院外採用
プレドニゾロン錠１mg	プレドニゾロン	院内院外採用
プレドニゾロン錠２．５ｍｇ「ＮＰ」	プレドニゾロン	院内院外採用
プレドニゾロン錠５mg	プレドニゾロン	院内院外採用
プレバイミス錠240mg	レテルモビル	院内院外採用
プレマリン錠0.６２５mg	結合型エストロゲン	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ｱﾄﾞﾋｰｼﾌﾞ 強化型ｼｰﾙ (8263)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ｱﾄﾞﾋｰｼﾌﾞ ﾅｲﾄ用 ｼｰﾙ (8261)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ｱﾄﾞﾋｰｼﾌﾞ 敏感肌用ｼｰﾙ 円形 (7463)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ｱﾄﾞﾋｰｼﾌﾞ 敏感肌用ｼｰﾙ 楕円型 (7464)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ｱﾄﾞﾋｰｼﾌﾞ 敏感肌用ｼｰﾙ 大型 (7466)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ｱﾄﾞﾋｰｼﾌﾞ 普通肌用ｼｰﾙ 円形 (7460)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ｱﾄﾞﾋｰｼﾌﾞ 普通肌用ｼｰﾙ 楕円型 (7461)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ｱﾄﾞﾋｰｼﾌﾞ 普通肌用ｼｰﾙ 大型 (7462)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ｴﾅｼﾞｰ HME (人工鼻) (8312)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ｺﾞｰ HME (人工鼻) (8310)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用

ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾅｲﾄ HME (人工鼻)　(8262)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾌﾘｰﾊﾝｽﾞ用 HME (人工鼻)　(7440)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾎｰﾑ HME (人工鼻)　(8311)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ付開窓型 10/36 (8052)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ付開窓型 10/55 (8053)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ付開窓型 12/36 (8054)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ付開窓型 12/55 (8055)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ付開窓型 8/36 (8048)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ付開窓型 8/55 (8049)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ付開窓型 9/36 (8050)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ付開窓型 9/55 (8051)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ付標準型 10/36 (7425)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ付標準型 10/55 (7426)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ付標準型 12/36 (7427)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ付標準型 12/55 (7428)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ付標準型 8/36 (7421)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ付標準型 8/55 (7422)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ付標準型 9/36 (7423)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ付標準型 9/55 (7424)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ 標準型 10/27 (7415)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ 標準型 10/36 (7416)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ 標準型 10/55 (7417)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ 標準型 12/27 (7418)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ 標準型 12/36 (7419)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ 標準型 12/55 (7420)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ 標準型 8/27 (7409)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ 標準型 8/36 (7410)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ 標準型 8/55 (7411)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ 標準型 9/27 (7412)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ 標準型 9/36 (7413)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ 標準型 9/55 (7414)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ 標準型開窓型 10/36 (7433)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ 標準型開窓型 10/55 (7434)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ 標準型開窓型 12/36 (7435)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ 標準型開窓型 12/55 (7436)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ 標準型開窓型 8/36 (7429)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ 標準型開窓型 8/55 (7430)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ 標準型開窓型 9/36 (7431)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ 標準型開窓型 9/55 (7432)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾎﾞﾀﾝ 12/18 (8041)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾎﾞﾀﾝ 12/8 (8040)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾎﾞﾀﾝ 14/18 (8043)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾎﾞﾀﾝ 14/8 (8042)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾎﾞﾀﾝ 16/18 (8045)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾎﾞﾀﾝ 16/8 (8044)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾎﾞﾀﾝ 18/18 (8047)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ ﾗﾘﾎﾞﾀﾝ 18/8 (8046)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽ ﾗｲﾌ 細菌・ｳｲﾙｽﾌｨﾙﾀｰ付 HME 人工鼻　(8313)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
プログラフカプセル 0.5mg	タクロリムス水和物	院内院外採用
プログラフカプセル 1mg	タクロリムス水和物	院内院外採用
プログラフ顆粒 0.2mg／包	タクロリムス水和物	院内院外採用
プロサイリン錠２０ug	ベラプロストナトリウム	院外採用

フロジン外用液5%　３０mL	塩化カルプロニウム	院内院外採用
ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE2錠0.5mg「科研」	ジノプロストン	院内院外採用
ﾌﾟﾛｽﾀﾝﾃﾞｨﾝ軟膏0.003% １０ｇ	アルプロスタジルアルファデクス	院内院外採用
プロセキソール錠０.５mg	エチニルエストラジオール	院外採用
フロセミド細粒４%「EMEC」40mg/ｇ（ﾗｼｯｸｽ後発）	フロセミド	院内院外採用
フロセミド錠10mg「NP」（ﾗｼｯｸｽ後発）	フロセミド	院内院外採用
フロセミド錠20mg「NP」（ﾗｼｯｸｽ後発）	フロセミド	院内院外採用
フロセミド錠40mg「NP」（ﾗｼｯｸｽ後発）	フロセミド	院内院外採用
ブロチゾラムOD錠0.25mg「ｻﾜｲ」(ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝD錠後発)	ブロチゾラム	院内院外採用
プロテカジン錠１０mg	ラフチジン	院外採用
プロトピック軟膏0.03%小児用５ｇ	タクロリムス	院内院外採用
プロトピック軟膏0.1%５ｇ	タクロリムス	院内院外採用
ブロナック点眼液0.1%　５mL	ブロムフェナクナトリウム	院外採用
ブロナンセリン錠4mg「DSPB」(ﾛﾅｾﾝ後発)	ブロナンセリン	院内院外採用
プロピベリン塩酸塩錠10ｍｇ「杏林」（ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ後発）	プロピベリン塩酸塩	院内院外採用
プロペシア錠0.2mg	フィナステリド	院外採用
プロマックＤ錠７５	ポラプレジンク	院外採用
プロマック顆粒１５%0.５ｇ包	ポラプレジンク	院外採用
ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝｼﾛｯﾌﾟ0.08%「ﾄｰﾜ」 0.8mg/mL(ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ後発)	ブロムヘキシン塩酸塩	院内院外採用
ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩吸入液0.2%「ﾀｲﾖｰ」(ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ後発)	ブロムヘキシン塩酸塩	院内院外採用
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「ｻﾜｲ」(ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ後発)	ブロムヘキシン塩酸塩	院内院外採用
フロリードＤクリーム1%１０ｇ	硝酸ミコナゾール	院外採用
フロリードゲル経口用2%５ｇ	ミコナゾール	院内院外採用
フロリネフ錠0.１mg	酢酸フルドロコルチゾン	院外採用
ベージニオ錠１００ｍｇ	アベマシクリブ	院外採用
ベージニオ錠１５０ｍｇ	アベマシクリブ	院外採用
ベージニオ錠５０ｍｇ	アベマシクリブ	院外採用
ベオーバ錠５０ｍｇ	ビベグロン	院内院外採用
ﾍﾞｸﾛﾒﾀｿﾞﾝ鼻用ﾊﾞｳﾀﾞｰ25μg「ﾄｰﾜ」(ﾘﾉｺｰﾄ後発)	ベクロメタゾンプロピオン酸エス	院外採用
ベサコリン散5%(５０mg/g)	塩化ベタネコール	院内院外採用
ベザトールＳＲ錠１００mg	ベザフィブラート	院外採用
ベザトールＳＲ錠２００mg	ベザフィブラート	院外採用
ベサノイドカプセル１０mg	トレチノイン	院外採用
ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg「ｻﾜｲ」（ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙ後発）	ベザフィブラート	院外採用
ベストロン耳鼻科用１%５mL	塩酸セフメノキシム	院外採用
ベストロン点眼用0.５%５mL	塩酸セフメノキシム	院内院外採用
ベセルナクリーム５%	イミキモド	院外採用
ベタナミン錠１０mg	ペモリン	院外採用
ベタニス錠 50mg	ミラベグロン	院外採用
ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝﾒｼﾙ酸塩錠6mg「日医工P」(ﾒﾘｽﾛﾝ後発)	ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝﾒｼﾙ酸塩	院内院外採用
ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」(旧ﾘﾝﾍﾞﾀ)	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ	院外採用
ベナンバックス注用300mg	イセチオン酸ペンタミジン	院内院外採用
ベニジピン塩酸塩錠4mg「ｻﾜｲ」（ｺﾆｰﾙ後発）	ベニジピン塩酸塩	院内院外採用
ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ皮下注5千単位ｼﾘﾝｼﾞ「ﾓﾁﾀﾞ」	ヘパリンカルシウム	院内院外採用
ヘパリン類似物質泡状ｽﾌﾟﾚｰ0.3%「ニットー」100g	ヘパリン類似物質	院内院外採用
ヘパリン類似物質泡状ｽﾌﾟﾚｰ0.3%「ニットー」200g	ヘパリン類似物質	院外採用
ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質油性ｸﾘｰﾑ「ﾆﾌﾟﾛ」25g (ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞｿﾌﾄ後発)	ヘパリン類似物質	院内院外採用
ベピオゲル2.5% 15g	過酸化ベンゾイル	院外採用
ベプシドカプセル２５mg	エトポシド	院外採用
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」（ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ後発）	ベプリジル塩酸塩水和物	院内院外採用
ﾍﾞﾎﾞﾀｽﾁﾝﾍﾞｼﾙ酸塩OD錠10mg「ﾀﾅﾍﾞ」(ﾀﾘｵﾝ後発)	ベボタスチンベシル酸塩	院内院外採用
ベムリディ錠25mg	ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｱﾗﾌｪﾅﾐﾄﾞ ﾌﾏﾙ酸塩	院内院外採用

ヘモポリゾン軟膏 2g(強力ﾎﾞｽﾃﾘｻﾞﾝ軟膏後発)	大腸菌死菌・ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ	院内院外採用
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(ワソラン後発)	ベラパミル塩酸塩	院内院外採用
ベラプロストNa錠20μg「ｵｰﾊﾗ」(ﾄﾞﾙﾅｰ後発)	ベラプロストナトリウム	院内院外採用
ペリアクチン散１０mg／ｇ	塩酸シプロヘプタジン	院外採用
ベリキューボ錠 2.5mg	ベルイシグアト	院内院外採用
ベリキューボ錠10mg	ベルイシグアト	院外採用
ベリチーム配合顆粒	濃厚膵臓性消化酵素,細菌性脂肪	院内院外採用
ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠2mg「ﾄｰﾜ」(ｺﾊﾞｼﾙ後発)	ペリンドプリルエルブミン	院内院外採用
ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠4mg「ﾄｰﾜ」(ｺﾊﾞｼﾙ後発)	ペリンドプリルエルブミン	院内院外採用
ペルジピンＬＡカプセル４０mg	塩酸ニカルジピン	院外採用
ベルソムラ錠１０mg	スボレキサント	院内院外採用
ベルソムラ錠１５ｍｇ	スボレキサント	院内院外採用
ベルソムラ錠２０mg	スボレキサント	院内院外採用
ヘルベッサーＲカプセル１００mg	塩酸ジルチアゼム	院内院外採用
ヘルベッサー錠３０mg	塩酸ジルチアゼム	院外採用
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「ｱﾒﾙ」 (ﾙｰﾗﾝ後発)	ペロスピロン塩酸塩水和物	院内院外採用
ベンザリン細粒1%(１０mg/g)	ニトラゼパム	院外採用
ベンザリン錠５mg	ニトラゼパム	院内院外採用
ベンズブロマロン錠50mg｢NIG｣(ﾕﾘﾉｰﾑ後発)	ベンズブロマロン	院外採用
ペンタサ坐剤 1g	メサラジン	院外採用
ペンタサ錠250mg	メサラジン	院外採用
ペンタサ錠500mg	メサラジン	院内院外採用
ペンタサ注腸１ｇ１００mL	メサラジン	院外採用
ペンタサ顆粒94%	メサラジン	院外採用
ホクナリンテープ0.５mg	塩酸ツロブテロール	院外採用
ホクナリンテープ１mg	塩酸ツロブテロール	院外採用
ホクナリンテープ２mg	塩酸ツロブテロール	院内院外採用
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg「武田ﾃﾊﾞ」(ﾍﾞｲｽﾝ後発)	ボグリボース	院内院外採用
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg「武田ﾃﾊﾞ」(ﾍﾞｲｽﾝ後発)	ボグリボース	院内院外採用
ポステリザン軟膏強力２ｇ	大腸菌死菌浮遊液, ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ	院外採用
ホスミシンＤＳ４００mg／ｇ	ホスホマイシンナトリウム	院外採用
ホスミシン錠５００mg	ホスホマイシンカルシウム	院内院外採用
ホスリボン配合顆粒 (100mg/包)	リン酸二水素Na,リン酸水素二Na	院内院外採用
ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院内院外採用
ポビドンヨードゲル10%｢ｹﾝｴｰ｣９０g(ｲﾝｼﾞﾝｹﾞﾙ後発)	ポビドンヨード	院内院外採用
ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ消毒液10%「ｹﾝｴｰ」 250mL(旧ｲｵﾀﾞｲﾝ)	ポビドンヨード	院内院外採用
ポラキス錠３mg	塩酸オキシブチニン	院外採用
ポラプレジンクOD錠75mg｢サワイ｣(ﾌﾟﾛﾏｯｸ後発)	ポラプレジンク	院内院外採用
ポララミンシロップ０．０４％ (0.4mg/mL)	ｄ-マレイン酸クロルフェニラミ	院外採用
ポララミン錠２mg	ｄ-マレイン酸クロルフェニラミ	院内院外採用
ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾌｨﾙCa細粒83.3%「日医工」0.6g/包(ｺﾛﾈﾙ後発)	ポリカルボフィルカルシウム	院内院外採用
ボリコナゾール錠200mg｢トーワ｣(ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ後発)	ボリコナゾール	院内院外採用
ホリゾン散１０mg／ｇ	ジアゼパム	院内院外採用
ポリフル錠５００ｍｇ	ポリカルボフィルカルシウム	院外採用
ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB硫酸塩錠100万単位「ﾌｧｲｻﾞｰ」	硫酸ポリミキシンＢ	院外採用
ボルズィ錠10mg	ボルノレキサント	院外採用
ボルズィ錠２．５mg	ボルノレキサント	院外採用
ボルズィ錠５mg	ボルノレキサント	院外採用
ボルタレンＳＲカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外採用
ボルタレンサポ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外採用
ボルタレンサポ２５mg	ジクロフェナクナトリウム	院外採用
ボルタレンサポ５０mg	ジクロフェナクナトリウム	院外採用

ﾎﾞﾝｱﾙﾌｧﾊｲﾛｰｼｮﾝ 20μg/g	タカルシトール	院外採用
ポンタールカプセル２５０mg	メフェナム酸	院外採用
ボンビバ錠100mg	イバンドロン酸ナトリウム水和物	院外採用
マーズレンS配合顆粒	ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ,L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ	院内院外採用
マーデュオックス軟膏 10g	ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ/ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙ	院外採用
マイクロンHME(7247)(5個/箱)	人工鼻	院外採用
マイクロンHME(7248)(30個/箱)	人工鼻	院外採用
マイコスポールクリーム１％１０ｇ	ビフォナゾール	院外採用
マイザー軟膏0.05％１０ｇ	ジフルプレドナート	院外採用
マイスタン細粒 １０mg／ｇ	クロバザム	院内院外採用
マイスタン錠５mg	クロバザム	院外採用
マイテラーゼ錠１０mg	塩化アンベノニウム	院外採用
マグミット細粒83％(833mg/g)	酸化マグネシウム	院外採用
マグミット錠100mg	酸化マグネシウム	院外採用
マグミット錠200mg	酸化マグネシウム	院外採用
マグミット錠250mg	酸化マグネシウム	院外採用
マクロゴール軟膏	マクロゴール	院内院外採用
マスーレッド錠25mg	モリデュスタットナトリウム	院外採用
マスキンＲエタノール液0.５％	グルコン酸クロルヘキシジン	院内院外採用
マリゼブ錠１２．５ｍｇ	オマリグリプチン	院外採用
マリゼブ錠２５mg	オマリグリプチン	院外採用
マンジャロ皮下注１０ｍｇｱﾃｵｽ	チルゼパチド	院外採用
マンジャロ皮下注１２．５ｍｇｱﾃｵｽ	チルゼパチド	院外採用
マンジャロ皮下注１５ｍｇｱﾃｵｽ	チルゼパチド	院外採用
マンジャロ皮下注２．５ｍｇｱﾃｵｽ	チルゼパチド	院内院外採用
マンジャロ皮下注５ｍｇｱﾃｵｽ	チルゼパチド	院内院外採用
マンジャロ皮下注７．５ｍｇｱﾃｵｽ	チルゼパチド	院外採用
ミオコールスプレー０.３mg	ニトログリセリン	院内院外採用
ﾐｶﾄﾘｵ配合錠(ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ80mg・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5mg・HCTZ12.5mg)	ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ・ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞ	院外採用
ミグシス錠5mg	ロメリジン塩酸塩	院外採用
ミグリトール錠50mg「トーワ」(セイブル後発)	ミグリトール	院内院外採用
ミケランＬＡ点眼液２％ 2.5mL	塩酸カルテオロール	院外採用
ミケラン点眼液２％５mL	塩酸カルテオロール	院外採用
ミケルナ配合点眼液 2.5mL/本	ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ塩酸塩・ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ	院内院外採用
ミチグリニドCa・OD錠10mg「TCK」(ｸﾞﾙﾌｧｽﾄ後発)	ミチグリニドカルシウム水和物	院内院外採用
ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ塩酸塩錠2mg「JG」(ﾒﾄﾘｼﾞﾝ後発)	ミドドリン塩酸塩	院内院外採用
ミドリンM点眼液０.４％ ５mL	トロピカミド	院内院外採用
ミドリンＰ点眼液５mL	トロピカミド,塩酸フェニレフリ	院内院外採用
ミニリンメルトOD錠１２０μｇ	デスモプレシン酢酸塩	院外採用
ミネブロOD錠２．５ｍｇ	エサキセレノン	院内院外採用
ミネブロOD錠５ｍｇ	エサキセレノン	院外採用
ミノマイシンカプセル１００mg	塩酸ミノサイクリン	院内院外採用
ミノマイシンカプセル５０mg	塩酸ミノサイクリン	院外採用
ミノマイシン顆粒2% (20mg/g)	塩酸ミノサイクリン	院内院外採用
ミヤＢＭ細粒	宮入菌	院内院外採用
ミヤＢＭ錠（２０mg)	宮入菌	院内院外採用
ミラペックスLA錠 0.375mg	プラミペキソール	院外採用
ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ	塩酸プラミペキソール	院外採用
ミルタザピンOD錠15mg「ｻﾜｲ」(ﾘﾌﾚｯｸｽ後発)	ミルタザピン	院内院外採用
ミルラクト細粒５０％ (500mg/g)	チラクターゼ	院内院外採用
ミンクリア内用散布液0.8% 20mL	l-メントール	院内院外採用
ムコサールドライシロップ1.5% (15mg/g)	塩酸アンブロキソール	院外採用

ムコスタ錠100mg	レバミピド	院外採用
ムコスタ点眼液ＵＤ2%0.35mL	レバミピド	院外採用
ムコダインDS50％(500mg/1g)	カルボシステインシロップ	院外採用
ムコダイン錠２５０mg	カルボシステイン	院外採用
ムコダイン錠５００mg	カルボシステイン	院外採用
メイラックス錠１mg	ロフラゼプ酸エチル	院外採用
メインテート錠0.625mg	フマル酸ビソプロロール	院外採用
メキシチールカプセル１００mg	塩酸メキシレチン	院外採用
メキシチールカプセル５０mg	塩酸メキシレチン	院外採用
ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg「ｻﾜｲ」(ﾒｷｼﾁｰﾙ後発)	メキシレチン塩酸塩	院内院外採用
メサデルムクリーム0.1% １０ｇ	プロピオン酸デキサメタゾン	院外採用
メサデルム軟膏0.1% １０ｇ	プロピオン酸デキサメタゾン	院外採用
メスチノン錠６０mg	臭化ピリドスチグミン	院内院外採用
メソトレキセート錠2.5mg	メトトレキサート	院内院外採用
メチコバール錠５００ug	メコバラミン	院内院外採用
メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	メチルエルゴメトリンマレイン酸	院内院外採用
ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.1mg｢NIG｣(ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ後発)	メチルジゴキシン	院内院外採用
メトグルコ錠250mg	塩酸メトホルミン	院内院外採用
メトグルコ錠500mg	メトホルミン塩酸塩	院外採用
メトトレキサート錠1mg「日本臓器」（ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽ後発）	メトトレキサート	院外採用
メトトレキサート錠2mg「日本臓器」（ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽ後発）	メトトレキサート	院外採用
メドロール錠４mg	メチルプレドニゾロン	院内院外採用
ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙｹﾞﾙ0.75%「ﾏﾙｲｼ」50ｇ/本（ﾛｾﾞｯｸｽ後発）	メトロニダゾールゲル	院内院外採用
メバロチン錠５mg	プラバスタチンナトリウム	院外採用
メプチンエアー10μｇ吸入100回	塩酸プロカテロール	院内院外採用
メプチン吸入液0.01%３０mL/本	塩酸プロカテロール	院外採用
メプチン吸入液ユニット０．３mL	塩酸プロカテロール	院内院外採用
ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩OD錠10mg「DSEP」(ﾒﾏﾘｰ後発)	メマンチン塩酸塩	院外採用
ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(ﾒﾏﾘｰ後発)	メマンチン塩酸塩	院内院外採用
メラトベル錠小児用１ｍｇ	メラトニン	院外採用
メラトベル顆粒小児用0.2% 2mg/g	メラトニン	院内院外採用
メリスロン錠６mg	メシル酸ベタヒスチン	院外採用
メルカゾール錠２．５mg	チアマゾール	院外採用
メルカゾール錠５mg	チアマゾール	院内院外採用
メンタックスクリーム1% １０ｇ	塩酸ブテナフィン	院外採用
モイゼルト軟膏1% 10g	ジファミラスト軟膏	院外採用
モービック錠１０mg	メロキシカム	院外採用
モーラスパップ３０ｍｇ7枚/包	ケトプロフェン	院外採用
モーラスパップXR240mg 7枚/包	ケトプロフェン	院外採用
ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ点眼液0.5%｢ｻﾝﾄﾞ｣5mL(ﾍﾞｶﾞﾓｯｸｽ後発)	モキシフロキサシン塩酸塩	院内院外採用
ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩散10mg/g｢日医工｣(ｶﾞｽﾓﾁﾝ後発)	ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩水和物	院内院外採用
モサプリドｸｴﾝ酸塩錠5mg｢AA｣(ｶﾞｽﾓﾁﾝ後発)	ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩水和物	院内院外採用
モニラックシロップ６５％	ラクツロース	院外採用
モビコール配合内用剤 ＨＤ	ﾏｸﾛｺﾞｰﾙ4000,NaCl,NaHCO3,KCl	院外採用
モビコール配合内用剤 LD	ﾏｸﾛｺﾞｰﾙ4000,NaCl,NaHCO3,KCl	院内院外採用
ﾓﾒﾀｿﾞﾝ点鼻液50μｇ「杏林」112噴霧用(ﾅｿﾞﾈｯｸｽ後発)	モメタゾンフランカルボン酸エス	院内院外採用
ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾁｭｱﾌﾞﾙ錠5mg「ﾀｶﾀ」（ｷﾌﾟﾚｽ/ｼﾝｸﾞﾚｱ後発）	モンテルカストナトリウム	院内院外採用
ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠１０mg「KM」（ｼﾝｸﾞﾚｱ/ｷﾌﾟﾚｽ後発）	モンテルカストナトリウム	院内院外採用
ヤーズフレックス配合錠（28錠/ｼｰﾄ）	ﾄﾞﾛｽﾋﾟﾚﾉﾝ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ	院外採用
ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０	テガフール，ウラシル配合剤	院外採用
ユーエフティ配合カプセルＴ１００	テガフール，ウラシル配合剤	院外採用
ユーゼル錠２５mg	ホリナートカルシウム	院外採用

ユナシン細粒小児用10% （100mg/ｇ）	トシル酸スルタミシリン	院内院外採用
ユナシン錠375mg	トシル酸スルタミシリン	院外採用
ユバンシ配合錠（ﾏｼﾃﾝﾀﾝ10mg/ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ40mg）	マシテンタン・タダラフィル	院外採用
ユリス錠０．５ｍｇ	ドチヌラド	院内院外採用
ユリス錠１ｍｇ	ドチヌラド	院外採用
ユリス錠２ｍｇ	ドチヌラド	院外採用
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	院内院外採用
ヨクイニンエキス錠コタロー	ヨクイニンエキス	院外採用
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	ｲﾝｽﾘﾝ ﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸ・ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ	院内院外採用
ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム	院外採用
ラクツロースシロップ65%「ﾀｶﾀ」（ﾓﾆﾗｯｸ後発）	ラクツロース	院内院外採用
ラグノス NF 経口ゼリー分包１２ｇ （ﾓﾆﾗｯｸ後発）	ラクツロース	院内院外採用
ラコールＮＦ配合経腸用液200mL	経腸成分栄養剤液	院内院外採用
ラコサミドドライシロップ10%｢JG｣(ﾋﾞﾑﾊﾟｯﾄ後発)	ラコサミド	院内院外採用
ラコサミド錠50mg「アメル」（ﾋﾞﾑﾊﾟｯﾄ後発）	ラコサミド	院内院外採用
ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩	院外採用
ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄPF点眼0.005%｢日点｣2.5mL（ｷｻﾗﾀﾝ後発）	ラタノプロスト	院内院外採用
ラツーダ錠20mg	ルラシドン塩酸塩	院内院外採用
ラックビー微粒Ｎ	ビフィズス菌製剤	院外採用
ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」（ﾊﾟﾘｴｯﾄ後発）	ラベプラゾールナトリウム	院内院外採用
ラミクタール錠小児用２ｍｇ	ラモトリギン	院外採用
ラミクタール錠小児用５ｍｇ	ラモトリギン	院外採用
ラメルテオン錠8mg｢サワイ｣(ﾛｾﾞﾚﾑ後発)	ラメルテオン	院内院外採用
ラモトリギン錠１００ｍｇ「トーワ」（ﾗﾐｸﾀｰﾙ後発）	ラモトリギン	院内院外採用
ラモトリギン錠２５ｍｇ「ﾄｰﾜ」（ﾗﾐｸﾀｰﾙ後発）	ラモトリギン	院内院外採用
ラリキシンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ小児用10%	セファレキシン	院内院外採用
ラリキシン錠250mg（ｾﾌｧﾚｷｼﾝcap代替）	セファレキシン	院内院外採用
ラリチューブBR型10/36(7628)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブBR型10/55(7629)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブBR型12/36(7630)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブBR型12/55(7631)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブBR型8/36(7624)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブBR型8/55(7625)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブBR型9/36(7626)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブBR型9/55(7627)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ開窓型10/36(7643)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ開窓型10/55(7644)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ開窓型12/36(7646)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ開窓型12/55(7647)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ開窓型8/36(7637)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ開窓型8/55(7638)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ開窓型9/36(7640)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ開窓型9/55(7641)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型10/27(7609)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型10/36(7610)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型10/55(7611)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型12/27(7613)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型12/36(7614)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型12/55(7615)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型8/27(7601)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型8/36(7602)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型8/55(7603)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用

ラリチューブ標準型9/27(7605)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型9/36(7606)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型9/55(7607)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリボタン12/18(7685)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリボタン12/8(7671)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリボタン14/18(7686)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリボタン14/8(7672)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリボタン16/18(7687)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリボタン16/8(7673)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリボタン18/18(7688)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリボタン18/8(7674)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」（ｴﾋﾞｽﾀ後発）	ラロキシフェン塩酸塩水和物	院内院外採用
ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg「ｻﾜｲ」(ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD後発)	ランソプラゾール	院内院外採用
ランタスＸＲ注ソロスター 450単位/ｷｯﾄ	ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ（遺伝子組換え）	院内院外採用
ランデル錠２０mg	塩酸エホニジピン	院外採用
リアルダ錠1200mg	メサラジン	院内院外採用
リアルダ錠600mg	メサラジン	院外採用
リーゼ錠５mg	クロチアゼパム	院外採用
リーバクト配合顆粒 4.15g/包	イソロイシン，ロイシン，バリン	院内院外採用
リーマス錠１００mg	炭酸リチウム	院外採用
リーマス錠２００mg	炭酸リチウム	院外採用
リウマトレックスカプセル２mg	メソトレキセート	院内院外採用
リオナ錠２５０ｍｇ	クエン酸第二鉄水和物	院内院外採用
リオベル配合錠LD(ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ25mg･ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ15mg)	アログリプチン・ピオグリタゾン	院外採用
リクシアナOD錠15mg	エドキサバントシル酸塩水和物	院外採用
リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	院内院外採用
リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物	院内院外採用
リザトリプタンOD錠10mg「ﾄｰﾜ」（ﾏｸｻﾙﾄ後発）	リザトリプタン安息香酸塩	院内院外採用
リザベンカプセル１００mg	トラニラスト	院内院外採用
リザベン細粒１０％ (100mg/g)	トラニラスト	院外採用
リザベン点眼液0.5% ５mL	トラニラスト	院外採用
リスパダールOD錠 0.5mg	リスペリドン	院外採用
リスパダールＯＤ錠１mg	リスペリドン	院外採用
リスペリドンOD錠1mg「ｱﾒﾙ」(ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ後発)	リスペリドン	院内院外採用
リスペリドン細粒1%「ﾖｼﾄﾐ」 10mg/g (ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ後発)	リスペリドン	院内院外採用
リスペリドン内用液１mg/mL「ﾄｰﾜ」（ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ後発）	リスペリドン	院内院外採用
リスミー錠１mg	塩酸リルマザホン	院内院外採用
リスモダンＲ錠１５０mg	ジソピラミド	院外採用
リスモダンカプセル１００mg	ジソピラミド	院外採用
リズモンＴＧ0.5％2.5mL	マレイン酸チモロール	院外採用
ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸Na錠17.5mg「日新」(ｱｸﾄﾈﾙ後発・骨粗鬆症用)	リセドロン酸ナトリウム水和物	院内院外採用
リドメックスコーワクリーム0.3%１０ｇ	吉草酸酢酸プレドニゾロン	院外採用
リドメックスコーワローション0.3%１０ｇ	吉草酸酢酸プレドニゾロン	院内院外採用
リドメックスコーワ軟膏0.3%１０ｇ	吉草酸酢酸プレドニゾロン	院内院外採用
ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝOD錠10mg「ﾊﾞｲｴﾙ」（ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ後発）	リバーロキサバン	院内院外採用
ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝOD錠15mg「ﾊﾞｲｴﾙ」（ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ後発）	リバーロキサバン	院内院外採用
リパクレオンカプセル１５０ｍｇ	パンクレリパーゼ	院内院外採用
リバゼブ配合錠HD（ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝ4mg,ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ10mg）	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外採用
リバゼブ配合錠LD（ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝ2mg,ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ10mg）	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外採用
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン	院内院外採用
リフキシマ錠200mg	リファキシミン	院内院外採用
リフヌア錠４５ｍｇ	ゲーファピキサントクエン酸塩	院外採用

リベルサス錠１４ｍｇ	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外採用
リベルサス錠３ｍｇ	セマグルチド（遺伝子組換え）	院内院外採用
リベルサス錠７ｍｇ	セマグルチド（遺伝子組換え）	院内院外採用
ﾘﾎﾞｽﾁﾝ点鼻液0.025mg112噴霧用	塩酸レボカバスチン	院外採用
リボトリール細粒0.5%（5mg/g）	クロナゼパム	院内院外採用
リボトリール錠0.５mg	クロナゼパム	院内院外採用
リボトリール錠１mg	クロナゼパム	院内院外採用
リボトリール錠２mg	クロナゼパム	院外採用
リマチル錠１００mg	ブシラミン	院外採用
ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠5μg「日医工」（ｵﾊﾟﾙﾓﾝ後発）	リマプロスト　アルファデクス	院内院外採用
リムパーザ錠100mg	オラパリブ	院外採用
リムパーザ錠150mg	オラパリブ	院外採用
リュウアト眼軟膏１%3.５ｇ	硫酸アトロピン	院内院外採用
ﾘﾙｿﾞｰﾙ錠50mg「AA」(ﾘﾙﾃｯｸ50後発)	リルゾール	院内院外採用
リンヴォック錠１５ｍｇ	ウパダシチニブ水和物	院外採用
リンヴォック錠３０ｍｇ	ウパダシチニブ水和物	院外採用
リンヴォック錠45ｍｇ	ウパダシチニブ水和物	院外採用
リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	院内院外採用
リンデロンＡ液点眼・点鼻用５mL	リン酸ベタメタゾンナトリウム	院内院外採用
リンデロンＡ軟膏眼耳科用５ｇ	リン酸ベタメタゾンナトリウム	院内院外採用
リンデロンＤＰ軟膏0.064%１０ｇ	ジプロピオン酸ベタメタゾン	院外採用
リンデロンＶＧクリーム１０ｇ	吉草酸ベタメタゾン（硫酸ｹﾞﾝﾀﾏｲ	院内院外採用
リンデロンＶＧローション１０mL	吉草酸ベタメタゾン（硫酸ｹﾞﾝﾀﾏｲ	院内院外採用
リンデロンＶＧ軟膏１０ｇ	吉草酸ベタメタゾン（硫酸ｹﾞﾝﾀﾏｲ	院内院外採用
リンデロンＶクリーム１０ｇ	吉草酸ベタメタゾン	院内院外採用
リンデロン－Ｖ軟膏0.12% 5g/本	吉草酸ベタメタゾン	院内院外採用
リンデロン坐剤1.０mg	ベタメタゾン	院外採用
ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ点眼･点耳･点鼻液0.1% 5mL	ベタメタゾン	院外採用
リンデロン点眼液0.０１％５mL	ベタメタゾン	院外採用
リンラキサー錠１２５mg	カルバミン酸クロルフェネシン	院外採用
リンラキサー錠２５０mg	カルバミン酸クロルフェネシン	院外採用
ルコナック爪外用液5%	ルリコナゾール	院外採用
ルジオミール錠１０mg	塩酸マプロチリン	院外採用
ルセフィ錠２．５ｍｇ	ルセオグリフロジン	院外採用
ルセフィ錠５mg	ルセオグリフロジン水和物	院外採用
ルティナス膣錠100ｍｇ	プロゲステロン	院外採用
ルテウム膣用坐剤400mg	プロゲステロン	院内院外採用
ルトラール錠２mg	酢酸クロルマジノン	院外採用
ルナHME(8013)(30個/箱)	人工鼻	院外採用
ルナアドヒーシブ(8014)(15枚入)	整形外科用テープ	院外採用
ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	院内院外採用
ルプキネスカプセル７．９ｍｇ	ボクロスポリン	院内院外採用
ルミガン点眼液0.03%2.5mL	ビマトプロスト	院外採用
ルミセフ皮下注２１０ｍｇペン	ブロダルマブ	院外採用
ルムジェブ注 カート	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾛ(遺伝子組換え)	院外採用
ルムジェブ注100単位/mL 10mL	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾛ(遺伝子組換え)	院外採用
ルムジェブ注ミリオペン	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾛ(遺伝子組換え)	院内院外採用
ルリコナゾールクリーム1%「ｲﾜｷ」10g（ﾙﾘｺﾝ後発）	ルリコナゾール	院内院外採用
ルリコナゾール軟膏1%「ｲﾜｷ」10g（ﾙﾘｺﾝ後発）	ルリコナゾール	院内院外採用
レイボー錠１００ｍｇ	ラスミジタンコハク酸塩	院外採用
レイボー錠５０ｍｇ	ラスミジタンコハク酸塩	院外採用
レキサルティＯＤ錠0.5ｍｇ	ブレクスピプラゾール	院内院外採用

レキサルティＯＤ錠１ｍｇ	ブレクスピプラゾール	院内院外採用
レキサルティＯＤ錠２ｍｇ	ブレクスピプラゾール	院外採用
レキソタン錠２mg	ブロマゼパム	院外採用
レキソタン錠５mg	ブロマゼパム	院外採用
レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	院外採用
レクチゾール錠２５mg	ジアフェニルスルホン	院外採用
レザルタス配合錠HD(ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ20mg･ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ16mg)	ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ、ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ	院外採用
レザルタス配合錠LD(ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ10mg･ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ8mg)	ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ、ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ	院外採用
レスキュラ点眼液0.12%５mL	イソプロピル　ウノプロストン	院外採用
レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	院内院外採用
レスプレン錠２０mg	塩酸エプラジノン	院内院外採用
レトロゾール錠2.5mg「ｻﾝﾄﾞ」（ﾌｪﾏｰﾗ後発）	レトロゾール	院内院外採用
レトロビルカプセル１００mg	ジドブジン	院内院外採用
レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	院内院外採用
レパグリニド錠０．５ｍｇ「サワイ」（ｼｭｱﾎﾟｽﾄ後発）	レパグリニド	院外採用
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」5mL(ﾑｺｽﾀ後発)	レバミピド	院内院外採用
レバミピド錠100mg「オーツカ」（ムコスタ後発）	レバミピド	院内院外採用
レバミピド顆粒20%「ﾀｶﾀ」（200mg/g）（ﾑｺｽﾀ後発）	レバミピド	院内院外採用
レペタン坐剤0.２mg	塩酸ブプレノルフィン	院内院外採用
レベチラセタム錠500mg「トーワ」（ｲｰｹﾌﾟﾗ後発）	レベチラセタム	院内院外採用
レベミル注フレックスペン	インスリンデテミル（遺伝子組換	院外採用
ﾚﾎﾞｶﾊﾞｽﾁﾝ点眼液0.025%「TS」（ﾘﾎﾞｽﾁﾝ後発）	レボカバスチン	院外採用
レボセチリジン塩酸塩DS5mg/g「ﾀｶﾀ」(ｻﾞｲｻﾞﾙ後発)	レボセチリジン塩酸塩	院内院外採用
ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg「ﾆﾌﾟﾛ」(ｻﾞｲｻﾞﾙ後発)	レボセチリジン塩酸塩	院内院外採用
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠250mg「DSEP」(ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg後発)	レボフロキサシン水和物	院内院外採用
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点眼液1.5%「VTRS」5mL(ｸﾗﾋﾞｯﾄ後発)	レボフロキサシン水和物	院内院外採用
レボレード錠 12.5mg	エルトロンボパグ　オラミン	院外採用
レボレード錠２５ｍｇ	エルトロンボパグ　オラミン	院外採用
レミニールOD錠12mg	臭化水素酸ガランタミン	院外採用
レミニールOD錠4mg	臭化水素酸ガランタミン	院内院外採用
レミニールOD錠8mg	臭化水素酸ガランタミン	院外採用
レルベア100エリプタ30吸入用	ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ/ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ	院外採用
レルベア200エリプタ30吸入用	ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ/ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ	院内院外採用
レルミナ錠４０ｍｇ	レルゴリクス	院外採用
レンドルミンＤ錠0.２５mg	ブロチゾラム	院外採用
レンビマカプセル 4mg	レンバチニブメシル酸塩	院内院外採用
レンビマカプセル10mg	レンバチニブメシル酸塩	院内院外採用
ロイケリン散１０％（100mg/g）	メルカプトプリン	院内院外採用
ロイコボリン錠５mg	ロイコボリンカルシウム	院外採用
ローコール錠 ３０mg	フルバスタチン	院内院外採用
ロキサチジン徐放カプセル75mg「ｻﾜｲ」（ｱﾙﾀｯﾄ後発）	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	院内院外採用
ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ錠150mg「トーワ」（ﾙﾘｯﾄﾞ後発）	ロキシスロマイシン	院内院外採用
ロキソニンゲル1% 25g	ロキソプロフェンナトリウム	院外採用
ロキソニンテープ100mg 7枚/袋	ロキソプロフェンナトリウム	院外採用
ロキソニンテープ５０ｍｇ７枚/袋	ロキソプロフェンナトリウム	院外採用
ロキソニンパップ100mg 7枚/袋	ロキソプロフェンナトリウム	院外採用
ロキソニン細粒10%（100mg/g）	ロキソプロフェンナトリウム	院内院外採用
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ100mg「科研」(後発) ７枚/袋	ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物	院内院外採用
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ50mg「科研」(後発) ７枚/袋	ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物	院外採用
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa細粒 60mg/包「ｻﾜｲ」(ﾛｷｿﾆﾝ後発)	ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物	院外採用
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」(ﾛｷｿﾆﾝ後発)	ロキソプロフェンナトリウム	院内院外採用
ロケルマ懸濁用散分包１０ｇ	ｼﾞﾙｺﾆｳﾑｼｸﾛｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物	院内院外採用

ロケルマ懸濁用散分包5g	ｼﾞﾙｺﾆｳﾑｼｸﾛｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物	院内院外採用
ロコアテープ7枚/袋	ｴｽﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ・ﾊｯｶ油	院内院外採用
ロコイドクリーム０．１％１０ｇ	酪酸ヒドロコルチゾン	院内院外採用
ロコイド軟膏０．１％１０ｇ	酪酸ヒドロコルチゾン	院内院外採用
ロサルタンK錠25mg「明治」(ﾆｭｰﾛﾀﾝ後発)	ロサルタンカリウム	院内院外採用
ロスバスタチンOD錠2.5mg｢ﾄｰﾜ｣(ｸﾚｽﾄｰﾙ後発)	ロスバスタチンカルシウム	院内院外採用
ロスバスタチンOD錠5mg｢ﾄｰﾜ｣(ｸﾚｽﾄｰﾙ後発)	ロスバスタチンカルシウム	院内院外採用
ロゼックスゲル0.75%１５ｇ	メトロニダゾールゲル	院外採用
ロドピン細粒１００mg／ｇ	ゾテピン	院外採用
ロドピン錠２５mg	ゾテピン	院内院外採用
ロナセンテープ20mg	ブロナンセリン	院内院外採用
ロナセンテープ40mg	ブロナンセリン	院内院外採用
ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」（ﾒｲﾗｯｸｽ後発）	ロフラゼプ酸エチル	院内院外採用
ロプレソールＳＲ錠１２０mg	酒石酸メトプロロール	院外採用
ロプレソール錠２０mg	酒石酸メトプロロール	院内院外採用
ロペミン小児用0.５mg／ｇ	塩酸ロペラミド	院外採用
ロペラミド塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg「ｻﾜｲ」(ﾛﾍﾟﾐﾝ後発)	塩酸ロペラミド	院内院外採用
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%｢NIG｣(ﾛﾍﾟﾐﾝ後発)	塩酸ロペラミド	院内院外採用
ロラゼパム錠0.5mg｢ｻﾜｲ｣(ﾜｲﾊﾟｯｸｽ後発)	ロラゼパム	院内院外採用
ロラゼパム錠1mg｢ｻﾜｲ｣(ﾜｲﾊﾟｯｸｽ後発)	ロラゼパム	院内院外採用
ロルカム錠４mg	ロルノキシカム	院外採用
ロレルコ錠２５０mg	プロブコール	院外採用
ロンサーフ配合錠Ｔ１５	ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ･ﾁﾋﾟﾗｼﾙ塩酸塩	院外採用
ロンサーフ配合錠Ｔ２０	ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ･ﾁﾋﾟﾗｼﾙ塩酸塩	院外採用
ワーファリン錠 0.5mg	ワルファリン	院内院外採用
ワーファリン錠１mg	ワルファリンカリウム	院内院外採用
ワーファリン錠５mg	ワルファリンカリウム	院外採用
ワイドシリン細粒100mg/g(ﾊﾟｾﾄｼﾝ後発)	アモキシシリン水和物	院内院外採用
ワイパックス錠0.５mg	ロラゼパム	院外採用
ワイパックス錠１mg	ロラゼパム	院外採用
ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	院外採用
亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	院内院外採用
杏仁（生薬キョウニン）	杏仁（生薬　キョウニン）	院外採用
塩化カリウム（山善） 13.4mEq/g	塩化カリウム	院内院外採用
塩化カリウム徐放錠600mg｢St｣(ｽﾛｰｹｰ後発)	塩化カリウム	院内院外採用
塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	院内院外採用
塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ「ＴＹＰ」	プロカルバジン塩酸塩	院外採用
塩酸モルヒネ	塩酸モルヒネ	院内院外採用
黄連（生薬オウレン）	黄連	院外採用
黄岑（生薬オウゴン）	黄岑	院外採用
黄耆（生薬オウギ）	オウギ	院外採用
牡丹皮（生薬ボタンピ）	牡丹皮	院外採用
牡蠣（生薬ボレイ）	牡蠣（生薬　ボレイ）	院外採用
葛根（生薬カッコン）	葛根	院外採用
乾姜（生薬カンキョウ）	乾姜	院外採用
甘草（生薬カンゾウ）	甘草（生薬　カンゾウ）	院外採用
桔梗（生薬キキョウ）	桔梗	院外採用
逆性石ケン液0.０２５％	塩化ベンザルコニウム	院内院外採用
強力レスタミンコーチゾﾝｺｰﾜ軟膏10g	ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ（硫酸ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ,酢	院内院外採用
桂皮（生薬ケイヒ）	桂皮（生薬　ケイヒ）	院外採用
五味子（生薬ゴミシ）	五味子	院外採用
厚朴（生薬コウボク）	厚朴（生薬　コウボク）	院外採用

細辛（生薬サイシン）	細辛	院外採用
産婦人科用ｲｿｼﾞﾝｸﾘｰﾑ5%　250g	ポビドンヨード	院内院外採用
酸化マグネシウム錠330mg｢ﾖｼﾀﾞ｣(旧ﾏｸﾞﾗｯｸｽ)	酸化マグネシウム	院内院外採用
酸化マグネシウム錠500mg｢ﾖｼﾀﾞ｣(旧ﾏｸﾞﾗｯｸｽ)	酸化マグネシウム	院内院外採用
柴胡（生薬サイコ）	柴胡	院外採用
新レシカルボン坐剤	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ，無水リン酸二水	院内院外採用
親水ワセリン	親水ワセリン	院外採用
辛夷（生薬シンイ）	辛夷	院外採用
人工涙液マイティア点眼液５mL	ほう酸，無機塩類	院内院外採用
人参（生薬ニンジン）	人参	院外採用
酢酸亜鉛錠25mg｢ﾉｰﾍﾞﾙ｣(ﾉﾍﾞﾙｼﾞﾝ後発)	酢酸亜鉛水和物	院内院外採用
酢酸亜鉛顆粒5%｢ｻﾜｲ｣ 50mg/g (ﾉﾍﾞﾙｼﾞﾝ後発)	酢酸亜鉛水和物	院内院外採用
生理食塩液（細口）５００mL／瓶	生理食塩液	院内院外採用
生理食塩液１００mL	生理食塩液	院内院外採用
生理食塩液２０mL	生理食塩液	院内院外採用
生理食塩液５００mL／袋	生理食塩液	院内院外採用
生姜（生薬ショウキョウ）	生姜（生薬　ショウキョウ）	院外採用
精製水	精製水	院内院外採用
精製水（滅菌）外用	精製水	院内院外採用
石膏（生薬セッコウ）	石膏	院外採用
川きゅう（生薬センキュウ）	川きゅう	院外採用
大黄（生薬ダイオウ）	大黄	院外採用
大棗（生薬タイソウ）	大棗（生薬　タイソウ）	院外採用
沢瀉（生薬タクシャ）	沢瀉	院外採用
単シロップ	白糖	院内院外採用
炭酸カルシウム（沈降）	炭酸カルシウム	院外採用
炭酸ﾗﾝﾀﾝOD錠250mg「ﾌｿｰ」（ﾎｽﾚﾉｰﾙ後発）	炭酸ランタン水和物	院内院外採用
炭酸リチウム錠100mg｢大正｣(ﾘｰﾏｽ後発)	炭酸リチウム	院内院外採用
炭酸リチウム錠200mg｢大正｣(ﾘｰﾏｽ後発)	炭酸リチウム	院内院外採用
炭酸水素ナトリウム｢ケンエー｣(旧ｼﾞｭｳｿｳ)	炭酸水素ナトリウム	院内院外採用
知母（生薬チモ）	知母	院外採用
地黄（生薬ジオウ）	地黄	院外採用
注射用HCG5,000単位「F」(溶解液付)	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	院内院外採用
猪苓（生薬チョレイ）	猪苓	院外採用
沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ錠500mg「三和」（ｶﾙﾀﾝ後発）	沈降炭酸カルシウム	院内院外採用
桃仁（生薬トウニン）	桃仁	院外採用
当帰（生薬トウキ）	当帰	院外採用
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	乳酸カルシウム	院内院外採用
乳糖	乳糖	院内院外採用
白色ワセリン「ヨシダ」	白色ワセリン	院内院外採用
白朮（生薬ビャクジュツ）	白朮	院外採用
麦門冬（生薬バクモンドウ）	麦門冬	院外採用
半夏（生薬ハンゲ）	半夏（生薬　ハンゲ）	院外採用
附子（生薬ブシ）	附子（生薬　ブシ）	院外採用
麻黄（生薬マオウ）	麻黄（生薬　マオウ）	院外採用
慢性疼痛用：オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外採用
慢性疼痛用：オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院外採用
慢性疼痛用：オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外採用
薬用炭「日医工」	薬用炭	院内院外採用
竜骨（生薬リュウコツ）	竜骨（生薬　リュウコツ）	院外採用
枳実（生薬キジツ）	枳実	院外採用
芍薬（生薬シャクヤク）	芍薬（生薬　シャクヤク）	院外採用

苡仁（生薬ヨクイニン）	苡仁（生薬　ヨクイニン）	院外採用
茯苓（生薬ブクリョウ）	茯苓	院外採用